



薬生発 0614 第 1 号  
平成 28 年 6 月 14 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長  
( 公 印 省 略 )

### 「血液製剤の使用指針」の一部改正について

血液製剤の使用適正化については、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について（平成 26 年 11 月 12 日付け薬食発 1112 第 12 号厚生労働省医薬食品局長通知）の別添 2 「血液製剤の使用指針」により示してきたところです。

今般、照射洗浄血小板-LR 「日赤」及び照射洗浄血小板 HLA-LR 「日赤」の製造販売承認に伴い、「血液製剤の使用指針」の一部を改正し、別添のとおりとしたので、貴職におかれでは下記に御留意の上、貴管内医療機関、日本赤十字社血液センター及び市町村に指針改正について周知いただき、血液製剤の使用適正化が推進されるようご協力願います。

#### 記

##### 1. 改正の趣旨

洗浄血小板製剤については、平成 28 年 3 月 28 日付で照射洗浄血小板-LR 「日赤」及び照射洗浄血小板 HLA-LR 「日赤」の製造販売が承認され、医療機関へ広く供給が開始される予定である。今般、これらの事情を踏まえ、洗浄血小板製剤の適正使用の推進を図る観点から、「血液製剤の使用指針」について、平成 28 年度第 1 回薬事・食品衛生審議会血液事業部会適正使用調査会において改正に向けた検討を行い、所要の改正を行うものである。なお、洗浄血小板製剤については、輸血による副作用を防止するという目的に鑑み当該製剤の使用が望ま



しい状態にある患者に対して適切に投与されるよう、その使用については改正内容を踏まえ、必要と考えられる場合に限ることをお願いする。

## 2. 主な改正内容

「III 血小板濃厚液の適正使用 6. 使用上の注意点」について、洗浄・置換血小板の適応及びその調製について記載したこと。

## 別添

### 目次

■「血液製剤の使用指針」	
〔要約〕赤血球液の適正使用	1
〔要約〕血小板濃厚液の適正使用	4
〔要約〕新鮮凍結血漿の適正使用	8
〔要約〕アルブミン製剤の適正使用	11
はじめに	14
I 血液製剤の使用の在り方	14
II 赤血球液の適正使用	18
III 血小板濃厚液の適正使用	26
IV 新鮮凍結血漿の適正使用	35
V アルブミン製剤の適正使用	43
VI 新生児・小児に対する輸血療法	48
おわりに	51
(参考)	76)

### 「血液製剤の使用指針」

平成17年9月（平成28年6月一部改正）

厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課

## 【要約】 赤血球液の適正使用

- 目的  
● 赤血球補充の第一義的な目的は、末梢循環系へ十分な酸素を供給することにある。

### ■ 使用指針

- 1) 慢性貧血に対する適応（主として内科的適応）

【血液疾患に伴う貧血】

- 高度の貧血の場合には、一般に1~2単位/日の輸血量とする。

- 慢性貧血の場合にはHb値7g/dLが輸血を行う一つの目安とされているが、貧血の程度、罹患期間等により必要量が異なり、一律に決めることは困難である。

- \* Hb値を10g/dL以上にする必要はない。

- 鉄欠乏、ビタミンB12欠乏、葉酸欠乏、自己免疫性溶血性貧血など、輸血以外の方

- 法で治癒可能である疾患には、原則として輸血を行わない。

【慢性出血性貧血】

- 消化管や泌尿生殖器から、少量長期的な出血による高度の貧血は原則として輸血は行わない。日常生活に支障を来す循環器系の臨床症状（労作時の動悸・息切れ、浮腫など）がある場合には、2単位の輸血を行い、臨床所見の改善の程度を観察する。全身状態が良好な場合は、ヘモグロビン(Hb)値6g/dL以下が一つの目安となる。

- 2) 急性出血に対する適応（主として外科的適応）

- Hb値が10g/dLを超える場合は輸血を必要とするのではないかが、6g/dL以下では輸血はほぼ必須とされている。

- \* Hb値のみで輸血の開始を決定することは適切ではない。

### 3) 手術期の輸血

- (1) 術前投与

- 患者の心肺機能、原疾患の種類（良性又は悪性）、患者の年齢や体重あるいは特殊な病態等の全身状態を把握して投与の必要性の有無を決定する。

- \* 慣習的に行われてきた術前投与のいわゆる10/30ルール（Hb値10g/dL、ヘマトクリット(Ht)値30%以上にすること）は近年では根拠のないものとされている。

- (2) 術中投与

- 循環血流量の20~50%の出血量に対しては、人工膠質液（ヒドロキシエチルデンプン

(HES), デキストランなど）を投与する。赤血球不足による組織への酸素供給不足が懸念される場合には、赤血球液を投与する。この程度までの出血では、等張アルブミン製剤(5%人血清アルブミン又は加熱人血漿たん白)の併用が必要となることは少ない。

- 循環血流量の50~100%の出血では、適宜等張アルブミン製剤を投与する。なお、人工膠質液を1,000mL以上必要とする場合にも等張アルブミン製剤の使用を考慮する。

- 循環血流量以上の大量出血（24時間以内に100%以上）時又は、100mL/分以上の急速輸血をするような事態には、新鮮凍結血漿や血小板濃厚液の投与も考慮する。
- 通常はHb値が7~8g/dL程度であれば十分な酸素の供給が可能であるが、冠動脈疾患などの心疾患あるいは肺機能障害や脳循環障害のある患者では、Hb値を10g/dL程度に維持することが推奨される。

### ■ 投与量

- 赤血球液の投与によって改善されるHb値は、以下の計算式から求めることができます。  
$$\text{予測上昇Hb値 (g/dL)} = \frac{\text{投与量 (g)}}{\text{循環血液体量 (dL)}} \times \frac{\text{体重 (kg)}}{100}$$

例えば、体重50kgの成人（循環血液体量35dL）にHb値19g/dLの血液製剤を2単位(400mL)由來の赤血球液-LR「日赤」の容量は約280mLである。したがって、1バッグ中の含有Hb量は約19g/dL×280/1000dL=約53gとなる）輸血することにより、Hb値は約1.5g/dL上昇することになる。

### ■ 不適切な使用

- 温潤因子の補充を目的とした新しい新鮮凍結血漿との併用
- 末期患者への投与

### ■ 使用上の注意点

- 1) 使用法
- 2) 感染症の伝播
- 3) 鉄の過剰負荷
- 4) 輸血後移植片対宿主病(PV-GvHD)の予防対策

- 5) 高カリウム血症
- 6) 溶血性副作用
- 7) 非溶血性副作用
- 8) ABO 血液型・Rh 型と交差適合試験
- 9) サイトメガロウイルス (CMV) 抗体陰性赤血球液

## 〔要約〕血小板濃厚液の適正使用

### ■ 目的

- 血小板輸血は、血小板成分を補充することにより止血を図り、又は出血を防止するこ  
とを目的とする。

### ■ 使用指針

以下に示す血小板数はあくまでも目安であって、すべての症例に合致するものではない。

- 血小板数が 2~5 万/ $\mu\text{L}$  では、止血困難な場合には血小板輸血が必要となる。
- 血小板数が 1~2 万/ $\mu\text{L}$  では、時に重篤な出血をみることがあり、血小板輸血が必要と  
なる場合がある。血小板数が 1 万/ $\mu\text{L}$  未満ではしばしば重篤な出血をみることがあるた  
め、血小板輸血を必要とする。
- \* 一般に、血小板数が 5 万/ $\mu\text{L}$  以上では、血小板輸血が必要となることはない。
- \* 慢性に経過している血小板減少症（再生不良貧血など）で、他に出血傾向を来す合  
併症がなく、血小板数が安定している場合には、血小板数が 5~1 万/ $\mu\text{L}$  であっても、  
血小板輸血は極力避けるべきである。

### 1) 活動性出血

- 血小板減少による重篤な活動性出血を認める場合（特に網膜、中枢神経系、肺、消化  
管などの出血）には、血小板数を 5 万/ $\mu\text{L}$  以上に維持するように血小板輸血を行う。

### 2) 外科手術の術前状態

- 血小板数が 5 万/ $\mu\text{L}$  未満では、手術の内容により、血小板濃厚液の準備又は、術直前  
の血小板輸血の可否を判断する。
- \* 待機的術患患者あるいは腰椎穿刺、硬膜外麻酔、経気管支鏡検、肝生検などの長髪  
を伴う処置では、術前あるいは施行前の血小板数が 5 万/ $\mu\text{L}$  以上あれば、通常は血小  
板輸血を必要とすることが多い。

### 3) 人工心肺使用手術時の周術期管理

- 術中・術後を通して血小板数が 3 万/ $\mu\text{L}$  未満に低下している場合には、血小板輸血の  
適応である。ただし、人工心肺離脱後の硫酸プロタミン投与後に血算及び凝固能を適宜  
検査、判断しながら、必要に応じて 5 万/ $\mu\text{L}$  程度を目標に血小板輸血開始を考慮する。
- \* 複雑な心大血管手術で長時間（3 時間以上）の人工心肺使用例、再手術などで広範な梗  
塞

着剥離を要する例、及び慢性的腎臓や肝臓の疾患で出血傾向をみる例の中には、血小板減少あるいは止血困難な出血（oozingなど）をみるとがあり、凝固因子の欠乏を伴わず、このような病態を呈する場合には、血小板数が5万/ $\mu$ L～10万/ $\mu$ Lになると血小板輸血を行う。

- 4) 大量輸血時
  - 急速失血により24時間以内に循環血液量相当量ないし2倍量以上の大量輸血が行われ、止血困難な出血症状とともに血小板減少を認める場合には、血小板輸血の適応となる。
- 5) 摻種性血管内凝固（DIC）
  - 出血傾向の強く現れる可能性のあるDIC（基礎疾患が白血病、癌、産科的疾患、重症感染症など）で、血小板数が急遽に5万/ $\mu$ L未満へと低下し、出血症状を認める場合には、血小板輸血の適応となる。

\* 出血傾向のない慢性DICについては、血小板輸血の適応はない。

- 6) 血液疾患
  - (1) 造血器腫瘍
    - 急性白血病・悪性リンパ腫などの覚解導入療法においては、血小板数が1～2万/ $\mu$ L未満に低下してきた場合には血小板数を1～2万/ $\mu$ L以上に維持するよう、計画的に血小板輸血を行う。
  - (2) 再生不良性貧血・骨髓異形成症候群
    - 血小板数が5千/ $\mu$ L前後ないしそれ以下に低下する場合には、血小板輸血の適応となる。

- \* 血小板減少は慢性和過多が多く、血小板数が5千/ $\mu$ L以上あって出血症状が皮下出血程度の輕微な場合には、血小板輸血の適応とはならない。
- (3) 免疫性血小板減少性紫斑病（ITP）
  - 特発性血小板減少性紫斑病（ITP）で外科的処置を行う場合には、まずステロイド剤等の事前投与を行い、これらの効果が不十分で大量出血の予測される場合には、適応となる場合がある。
  - 特発性血小板減少性紫斑病（ITP）は、通常は血小板輸血の対象とはならない。
  - ITPの母親から生まれた新生児で重篤な血小板減少症をみる場合には、交換輸血のほかに副腎皮質ステロイドあるいは免疫グロブリン製剤の投与とともに血小板輸血を必要とする。

するところがある。

- 血小板特異抗原の母児間不適合による新生児同種免疫性血小板減少症（NAIT）で、重篤な血小板減少をみる場合には、血小板特異抗原同型の血小板輸血を行う。

\* 輸血後紫斑病（PIP）では、血小板輸血の適応はない。

- (4) 血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）及び溶血性尿毒症症候群（HUS）
  - \* 原則として血小板輸血の適応とはならない。
- (5) 血小板機能異常症
  - 重篤な出血ないし止血困難な場合にのみ血小板輸血の適応となる。
- (6) その他：ヘリクス起因性血小板減少症（Heparin Induced Thrombocytopenia； HIT）
  - HITが強く疑われる若しくは確定診断された患者において、明らかな出血症状がない場合には予防的血小板輸血は避けるべきである。
- 7) 固形腫瘍
  - 固形腫瘍に対して強力な化学療法を行う場合には、必要に応じて血小板数を測定する。
  - 血小板数が2万/ $\mu$ L未満に減少し、出血傾向を認める場合には、血小板数が1～2万/ $\mu$ L以上を維持するよう血小板輸血を行う。
- 8) 造血幹細胞移植（骨髄移植等）
  - 造血幹細胞移植後に骨髓機能が回復するまでの期間は、血小板数が1～2万/ $\mu$ L以上を維持するよう計画的に血小板輸血を行う。
  - 通常、出血予防のためにには血小板数が1～2万/ $\mu$ L未満の場合が血小板輸血の適応となる。

## ■ 投与量

$$\text{血小板輸血直後の予測血小板増加数} (\mu\text{L}) = \frac{\text{輸血血小板総数}}{\text{循環血液体量}(\text{mL}) \times 10^3} \times \frac{2}{3}$$

(循環血液体量は70mL/kgとする)

例えば、血小板濃厚液5単位（ $1.0 \times 10^{11}$ 個以上の血小板を含有）を循環血液体量5,000mL（体重71kg）の患者に輸血すると、直後には輸血前の血小板数より13,500/ $\mu$ L以上増加することが見込まれる。  
なお、一回投与量は、原則として上記計算式によるが、実務的には通常10単位が使用される。

れている。体重25kg以下の小児では10単位を3~4時間かけて輸血する。

### ■ 不適切な使用

- 末期患者への血小板輸血の考え方
- 単なる時間的延命のための投与は控えるべきである。

### ■ 使用上の注意点

- 1) ABO血液型・Rh型と交差適合試験
- 2) 感染症の伝播
- 3) 輸血後移植片排斥抗体（PT-GHD）の予防対策
- 4) サイトメガロウイルス(MV)抗体陰性小板濃厚液
- 5) HLA適合血小板濃厚液
- 6) ABO血液型・Rh型と交差適合試験
- 7) ABO血液型不適合輸血
- 8) 洗浄・置換血小板の適応及びその調製

### 〔要約〕新鮮凍結血漿の適正使用

#### ■ 目的

- 凝固因子の補充による治療的投与を主目的とする。観血的処置時を除いて新鮮凍結血漿の予防的投与の意味はない。

#### ■ 使用指針

- 新鮮凍結血漿の投与は、他に安全で効果的な血漿分画剤あるいは代替医薬品（リコンビナント製剤など）がない場合にのみ、適応となる。投与に当たっては、投与前にプロトロンビン時間（PT）、活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）を測定し、大量出血ではフィブリノゲン値も測定する。
- 1) 凝固因子の補充
    - (i) PT及び/又はAPTTが延長している場合（PTは(i) INR 2.0以上、(ii) 30%以下）
    - (ii) APTTは(i) 各医療機関における基準の上限の2倍以上、(ii) 25%以下とする
  - 肝障害：肝障害により複数の凝固因子活性が低下し、出血傾向のある場合に適応となる。
  - \* PTがINR 2.0以上（30%以下）で、かつ観血的処置を行う場合を除いて新鮮凍結血漿の予防的投与の適応はない。
  - リーアスパラギナーゼ投与関連：肝臓での産生低下による凝固因子の減少に加え、抗凝固因子や緩溶因子の産生低下がみられる場合、これらの諸因子を同時に補給するために新鮮凍結血漿を用いる。
  - 撫養性血管内凝固（DIC）：通常、(i) に示すPT、APTTの延長のほかフィブリノゲン値が100mg/dL未満の場合に新鮮凍結血漿の適応となる（参考資料1 DIC診断基準参照）。
  - 大量輸血時：希釈性凝固障害による止血困難が起こる場合に新鮮凍結血漿の適応となる。
  - 外傷などの救急患者では、消費性凝固障害が併存しているかを検討し、凝固因子欠乏による出血傾向があると判断された場合に限り、新鮮凍結血漿の適応がある。
  - 凝縮製剤のない凝固因子欠乏症：血液凝固第V、第XI因子のいずれかの欠乏症又はこれらを含む複数の欠乏症では、出血症状を示しているか、観血的処置を行う際に新鮮凍結血漿が適応となる。
  - クマリン系薬剤（フルファリンなど）の効果の緊急補正（PTがINR 2.0以上（30%以下））：ビタミンKの補給により通常1時間以内に改善が認められる。より緊急な対応の

ために新鮮凍結血漿の投与が必要になることがあるが、この場合でも直ちに使用可能な場合には「濃縮プロトロンビン複合体製剤」を使用することも考えられる。

(2) 低フィブリノゲン血症 (100mg/dL未満) の場合

- 損傷性血管内凝固 (DIC)
- L-アスパラギナーゼ投与後

- 2) 凝固阻害因子や凝溶因子の補充
  - プロテイン C やプロテイン S の欠乏症における血栓症の発症時には必要に応じて新鮮凍結血漿により欠乏因子を補充する。プラミンインヒビターの欠乏による出血症状に対する抗凝溶薬を併用し、効果が不十分な場合には新鮮凍結血漿を投与する。
- 3) 血漿因子の補充 (PT 及び APTT が正常な場合)
  - 血栓性血小板減少性紫斑病 (TPP)：後天性 TPP に対しては新鮮凍結血漿を置換液とした血漿交換療法を行う。先天性 TPP では、新鮮凍結血漿の単独投与で充分な効果がある。  
\* 後天性溶血性尿毒症症候群 (HUS) では、新鮮凍結血漿を用いた血漿交換療法は必ずしも有効ではない。

## ■ 投与量

- 生理的な止血効果を期待するための凝固因子の最少の血中活性値は、正常値の 20%~30%程度である。
- 循環血漿量を 40mL/kg (70mL/kg (1-Ht/100)) とし、補充された凝固因子の血中回収率は目的とする凝固因子により異なるが、100%とすれば、凝固因子の血中レベルを約 20~30%上昇させるのに必要な新鮮凍結血漿量は、理論的には 8~12mL/kg (40mL/kg の 20~30%) である。

## ■ 不適切な使用

- 1) 循環血漿量減少の改善と補充
  - 2) たん白質源としての栄養補給
  - 3) 創傷治療の促進
  - 4) 末期患者への投与
  - 5) その他
- 重症感染症の治療、DIC を伴わない熱傷の治療、人工心肺使用時の出血予防、非代償性肝硬変での出血予防なども新鮮凍結血漿投与の適応とはならない。

## 〔要約〕アルブミン製剤の適正使用

### ■ 目的

- アルブミン製剤を投与する目的は、血漿膠浸透圧を維持することにより循環血漿量を確保すること及び体腔内液や組織間液を血管内に移行させることによって治療抵抗性の重度の浮腫を治療することにある。
- 使用指針
- 1) 出血性ショック等
- 循環血漿量の30%以上の出血をみる場合は、細胞外液補充液の投与が第一選択となり、人工膠質液の併用も推奨されるが、原則としてアルブミン製剤の投与は必要としない。
- 循環血漿量の65%以上の多量の出血が疑われる場合や血清アルブミン濃度が3.0g/dL未満の場合には、等張アルブミン製剤の併用を考慮する。
- 腎機能障害などで人工膠質液の使用が不適切と考えられる場合には、等張アルブミン製剤を使用する。また、人工膠質液を1,000mL以上必要とする場合にも、等張アルブミン製剤の使用を考慮する。

### 2) 人工心肺を使用する心臓手術

通常、心臓手術時の人工心肺の充填には、主として細胞外液補充液が使用される。人工心肺実施中の血流希釈で起こった一時的な低アルブミン血症は、アルブミン製剤を投与して補正する必要はない。ただし、術前より血清アルブミン濃度又は膠質浸透圧の高度な低下のある場合、あるいは体重10kg未満の小児の場合などには等張アルブミン製剤が用いられることがある。

### 3) 肝硬変に伴う難治性腹水に対する治療

- 大量(4L以上)の腹水穿刺時に循環血漿量を維持するため、高張アルブミン製剤の投与が考慮される。また、治療抵抗性の腹水の治療に、短期間を限度とする。)に高張アルブミン製剤を併用することがある。
- 肝硬変などの慢性の病態による低アルブミン血症は、それ自体ではアルブミン製剤の適応とはならない。

### 4) 難治性の浮腫、肺水腫を伴うネフローゼ症候群

- ネフローゼ症候群などの慢性の病態は、通常アルブミン製剤の適応とはならないが、

急性かつ重症の末梢性浮腫あるいは肺水腫に対しては、利尿薬に加えて短期的(1週間を限度とする。)に高張アルブミン製剤の投与を必要とする場合がある。

### 5) 循環動態が不安定な血液透析等の体外循環施行時

- 血圧の安定が悪い場合には、特に糖尿病を合併している場合や術後などで低アルブミン血症のある場合には、循環血漿量を増加させる目的で予防的投与を行うことがある。

### ■ 使用指針

#### 6) 痢疾因子の補充を必要としない治療的血漿交換法

- \* キランバレー症候群、急性腎炎無力症など糞便因子の補充を必要としない症例では、等張アルブミン製剤を使用する。
- \* 加熱入血漿たん白は、まれに血压低下をきたすので、原則として使用しない。

#### 7) 重症熱傷

- 热傷部位が体表面積の50%以上あり、細胞外液補充液では循環血漿量の不足を是正することが困難な場合には、人工膠質液あるいは等張アルブミン製剤で対処する。  
\* 热傷後、通常18時間以内は原則として細胞外液補充液で対応するが、18時間以内であっても、血清アルブミン濃度が1.5g/dL未満の時は適応を考慮する。
- 8) 低たん白血症に起因する肺水腫あるいは著明な浮腫が認められる場合
- 術前、術後あるいは経口摂取不能な重症の下痢などによる低たん白血症が存在し、治療抵抗性の肺水腫あるいは著明な浮腫が認められる場合には、高張アルブミン製剤の投与を考慮する。

#### 9) 循環血漿量の著明な減少を伴う急性肺炎など

- 急性肺炎、腸閉塞などで循環血漿量の著明な減少を伴うショックを起こした場合には、等張アルブミン製剤を使用する。

### ■ 投与量

- 投与量の算定には下記の計算式を用いる。このようにして得られたアルブミン量を患者の膀胱に応じて、通常2~3日で分割投与する。  
必要投与量 (g) = 期待上昇濃度 (g/dL) × 循環血漿量 (dL) × 2.5  
ただし、期待上昇濃度は期待値と実測値の差、循環血漿量は0.4dL/kg、投与アルブミン

ンの血管内回収率は4/10(40%)とする。

### ■ 不適切な使用

- 1) たん白質源としての栄養補給
- 2) 脳虚血
- 3) 単なる血清アルブミン濃度の維持
- 4) 末期患者への投与

### ■ 使用上の注意点

- 1) ナトリウム含有量
- 2) 肺水腫、心不全
- 3) 血圧低下
- 4) 利尿
- 5) アルブミン合成能の低下

## はじめに

近年、血液製剤の安全性は格段に向ってきたが、免疫性、感染性などの副作用や合併症が生じる危険性がいまだにあり、腫瘍のものも含めればその頻度は決して低いとは言えず、致命的な転帰をとることもあることから、血液製剤が本来的に有する危険性を改めて認識し、より適正な使用を推進する必要がある。

また、血液製剤は人体の一部であり、有限で貴重な資源である血液から作られていることから、その取扱いには倫理的観点からの配慮が必要であり、すべての血液製剤について自国内での自給を目指すことが国際的な原則となっている。従って、血液の国内完全自給の達成のためにには血液製剤の使用適正化の推進が不可欠である。

このため、厚生省では、1986年に、採血基準を改正して血液の量的確保対策を講じるとともに、「血液製剤の使用適正化基準」を設け、血液製剤の国内自給の達成を目指すこととした。一方、1989年には医療機関内の輸血がより安全かつ適正に行われるよう「輸血療法の適正化に関するガイドライン」を策定した。また、1994年には「血小板製剤の使用基準」、1999年には「血液製剤の使用指針」及び「輸血療法の実施に関する指針」が策定された。

1982年には濃縮凝固因子製剤の国内自給が達成され、アルブミン製剤（人血清アルブミン、加熱人血清たん白）の自給率は5%（1985年）から62.8%（2007年）へ、免疫グロブリン製剤の自給率は40%（1985年）から95.9%（2007年）へと上昇した。一方、血液製剤の使用量は平成11年から年々減少しており、平成19年には血漿製剤で約3/5、アルブミン製剤で約2/3になっている。

しかし、赤血球及び血小板濃厚液の使用量は横ばい、免疫グロブリンは平成15年度にはじめて減少に向かうなど、十分な効果がみられているとは言い切れない状況となっている。また、諸外国と比べると、血漿成分製剤赤血球成分製剤比（2003年）が約3倍の状況にとどまつており、さらなる縮減が可能と想定される。国内自給率をさらに向上させることも、感染の可能性を削減するために、これらの製剤を含む血液の国内完全自給、安全性の確保及び適正使用を目的とする、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和31年法律第160号）が平成15年7月に改正施行された。以上の観点より医療現場における血液製剤の適正使用を一層推進する必要がある。

## I 血液製剤の使用の在り方

### 1. 血液製剤の原則

血液製剤を使用する目的は、血液成分の欠乏あるいは機能不全により臨床問題となる

症状を認めるとときに、その成分を補充して症状の軽減を図ること（補充療法）にある。このような補充療法を行う際には、毎回の投与時に各成分の到達すべき目標値を臨床症状と臨床検査値から予め設定し、次いで補充すべき血液成分量を計算し、さらに生体内における血管内外の分布や代謝速度を考慮して補充量を補正し、状況に応じて補充間隔を決める必要がある。また、毎回の投与後には、初期の目的、目標がどの程度達成されたかについての有効性的評価を、臨床症状と臨床検査値の改善の程度に基づいて行い、同時に副作用と合併症の発生の有無を観察し、診断録に記録することが必要である。

## 2. 血液製剤使用上の問題点と使用指針の在り方

血液製剤の使用については、単なる使用者の経験に基づいて、その適応及び血液製剤の選択あるいは投与方法などが決定され、しばしば不適切な使用が行われてきたことが問題としてあげられる。このような観点から、本指針においては、内外の研究成果に基づき、合理的な検討を行ったものであり、今後とも新たな医学的知見が得られた場合には、必要に応じて見直すこととする。

また、本指針は必ずしも医師の裁量を制約するものではないが、本指針と異なった適応、使用方法などにより、重篤な副作用や合併症が認められることがあれば、その療法の妥当性が問題とされる可能性もある。したがって、患者への血液製剤の使用についての説明と同意（インフォームド・コンセント）\*の取得に際しては、原則として本指針を踏まえた説明をすることが望まれる。

さらに、本指針は保険診療上の審査基準となることを意図するものではないが、血液製剤を用いた適正な療法の推進を目的とする観点から、保険審査の在り方を再検討する手がかりとなることを期待するものである。

\* 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第68条の21で規定されている。

## 3. 剤剤ごとの使用指針の考え方

### 1) 赤血球液と全血の投与について

#### 適応の現状と問題点

一部の外科領域では、現在でも全血の使用あるいは全血の代替としての赤血球液と新鮮凍結血漿の等量の併用がしばしば行われている。しかしながら、成分輸血が導入されて、既に20年以上が経過し、この間、從来は専ら全血が使われていた症例についても、赤血球が単独で用いられるようになり、優れた臨床効果が得られることが確認されてきたことから、血液の各成分の特性を生かした成分輸血療法を一層推進するため、成分別の種々の

病態への使用指針を策定することとした。なお、全血の適応についてはエビデンスが得られないなく、全血の供給を継続することは、血液の有効利用を妨げることから血液製剤全体の供給体制にも問題を生じている。

自己血輸血の推進  
同種血輸血の安全性は飛躍的に向上したが、いまだに感染性ウイルスなどの伝播・感染や免疫学的な合併症が生じる危険性があり、これらの危険性を可能な限り回避することが求められる。現在、待機的手術における輸血症例の80~90%は、2,000mL以内の出血量で手術を終えている。したがって、これらの手術症例の多くは、術前貯血式、血液希釈式、術中・術後回収式などの自己血輸血を十分に活用することにより、同種血輸血を行うことなく安全に手術を行うことが可能となっている。輸血が必要と考えられる待機的手術の際に、過誤輸血や細菌感染等院内感染の発生に十分配慮する必要があるものの、自己血輸血による同種血輸血回避の可能性を検討し、自己輸血を積極的に推進することが適正使用を実践するためにも推奨される。

### 2) 血小板濃厚液の投与について

適応の現状と問題点  
血小板濃厚液は原疾患にかかわらず、血小板数の減少、又は血小板機能の低下ないし異常ににより、重篤な、時として致死的な出血症状（活動性出血）を認めるとき、血小板の数と機能を補充して止血すること（治療的投与）を目的とする場合と、血小板数により起ることが予測される重篤な出血を未然に防ぐこと（予防的投与）を目的とする場合に行われているが、その70~80%は予防的投与として行われている。

血小板濃厚液の使用量は年々増加傾向にあつたが、この数年間横ばい状態となっているが、再度増加する可能性が高い。その背景としては高齢化社会の到来による悪性腫瘍の増加が含まれることとともに、近年、主に造血器腫瘍に対して行なわれてきた強力な化学療法が固形腫瘍の治療にも拡大され、また、外科的処置などに伴う使用も多くなったことが挙げられる。

しかしながら、血小板濃厚液は有効期間が短いこともあり、當時必要量を確保して輸血することは容易ではない状況である。したがって、輸血本来の在り方である血小板数をチエックしてから輸血することが実際上は不可能であり、特に予防的投与では血小板減少を予め見込んで輸血時の血小板数に関係なく定期的に行なわざるを得ないことを強いていいるのが現状である。

### 3) 新鮮凍結血漿の投与について 適応の現状と問題点

新鮮凍結血漿は、感染性の病原体に対する不活化処理がなされていないため、輸血感染症を伝播する危険性を有していること及び血漿たん白濃度は血液保存液により希釈されてしまうことに留意する必要がある。なお、日本赤十字社の血液センターでは新鮮凍結血漿の貯留保管を行っており、平成17年7月から6ヵ月の貯留保管を行った製剤が供給されている。

現在、新鮮凍結血漿を投与されている多くの症例においては、授与直前の凝固系検査が異常であるという本来の適応病態であることは少なく、また適応症例においても投与後にこれらの検査値異常の改善が確認されていることはさほどない。新鮮凍結血漿の適応と投与量の決定が、適正に行われているとは言い難いことを端的に示す事実である。また、従来より新鮮凍結血漿は単独で、あるいは赤血球液との併用により、循環血漿量の補充に用いられてきた。しかしながら、このよう目的のために、より安全な細胞外液補充液（乳酸リンゴル液、酢酸リシングル液など）や人工膠質液（HES、テキストランなど）あるいは等張のアルブミン製剤を用いることが推奨される。このようなことから、今回の指針においては、新鮮凍結血漿の適応はごく一部の例外（TTP/HUS）を除いて、複合的な凝固因子の補充に限られることを明記した。

血漿分画製剤の国内自給推進  
我が国における新鮮凍結血漿及びアルブミン製剤の使用量は、いまだに多い。凝固因子以外の原料血漿の国内自給を完全に達成するためには、限りある資源である血漿成分の有効利用、特に新鮮凍結血漿の適正使用を積極的に推進することが極めて重要である。

### 4) アルブミン製剤の投与について 適応の現状と問題点

アルブミン製剤（人血清アルブミン及び加熱人血漿たん白）が、低栄養状態への栄養素としてのたん白質源の補給にいまだにしばしば用いられている。しかしながら投与されたアルブミンは体内で代謝され、多くは熱源となり、たん白合成にはほとんど役に立たないので、たん白質源の補給という目的は達成し得ない。たん白質源の補給のためには、中心静脈栄養法や経腸栄養法による栄養状態の改善が通常優先されるべきである。また、低アルブミン血症は認められるものの、それに基づく臨床症状を伴わないか、軽微な場合にも検査値の補正のみの目的で、アルブミン製剤がしばしば用いられているが、その医学的

根拠は明示されていない。このように合理性に乏しく根拠の明確でない使用は適応にならないことを当該使用指針に明示した。

アルブミン製剤の自給推進  
わが国のアルブミン製剤の使用量は、原料血漿換算で、過去の最大使用量の384万L(1985年)から146万L(2010年)へと約62%急減したもの、赤血球液に対する使用比率はいまだ欧米諸国よりもかなり多い状況となっている。したがって、アルブミン製剤の国内自給を達成するためには、熱血血漿による原料血漿の確保と併せて、アルブミン製剤の適応をより適切に行うことが重要である。

- 5) 小児に対する輸血療法について  
小児科領域においては、使用する血液製剤の絶対量が少ないので、その適正使用についての検討が行われない傾向にあつたが、少子高齢社会を迎つつある現状を踏まえると、その適正使用を積極的に推進することが必須である。しかしながら、小児一般に対する血液製剤の投与基準については、いまだ十分なコンセンサスが得られているとは言い難い状況にあることから、未熟兒についての早期貧血への赤血球液の投与方法、新生兒への血小板濃厚液の投与方法及び新生兒への新鮮凍結血漿の投与方法に限定して指針を策定することとした。

## II 赤血球液の適正使用

### 1. 目的

赤血球液(Red Blood Cells; RBC)は、急性あるいは慢性的出血に対する治療及び貧血の急速な補正を必要とする病態に使用された場合、最も確実な臨床的効果を得ることができる。このような赤血球補充の第一義的な目的は、末梢循環系へ十分な酸素を供給することにあるが、循環血浆量を維持するという目的もある。

### 2. 使用指針

- 1) 慢性貧血に対する適応（主として内科的適応）  
内科的な貧血の多くは、慢性的な造血管疾患に起因するものであり、その他、慢性的な消化管出血や子宮出血などがある。これらにおいて、赤血球輸血を要する代表的な疾患は、再生不良性貧血、骨髓異形症候群、造血器悪性腫瘍などである。

### ア 血液疾患に伴う貧血

貧血の原因を明らかにし、鉄欠乏、ビタミンB<sub>12</sub>欠乏、葉酸欠乏、自己免疫性溶血性貧血など、輸血以外の方法で治療可能である疾患には、原則として輸血を行わない。

輸血を行う目的は、貧血による症状が持続することであるが、その値を一律に決めることが困難である。しかしながら、Hb7g/dLが輸血を行う一つの目安とされているが、この値は、貧血の進行度、罹患期間、日常生活や社会生活の活動状況、合併症（特に循環器系や呼吸器系の合併症）の有無などにより異なり、Hb7g/dL以上でも輸血が必要な場合もあれば、それ未満でも不要な場合もあり、一律に決めるることは困難である。従って輸血の適応を決定する場合には、検査値のみならず循環器系の臨床症状を注意深く観察し、かつ生前の活動状況を勘案する必要がある。その上で、臨床症状の改善が得られるHb値を個々に設定し、輸血施行の目安とする。

高度の貧血の場合には、循環血漿量が増加していること、心臓に負担がかかっていることから、一度に大量の輸血を行いうと心不全、肺水腫をきたすことがある。一般に1~2単位/日の輸血量とする。腎障害を合併している場合には、特に注意が必要である。

いずれの場合でも、Hb値を10g/dL以上にする必要はない。繰り返し輸血を行いう場合には、投与前の臨床症状の改善の程度やHb値の変化を比較し効果を評価するとともに、副作用の有無を観察した上で、適正量の輸血を行う。なお、頻回の投与により鉄過剰状態（iron overload）を来すので、不必要的投与間隔を長くする。

なお、造血幹細胞移植における留意点を巻末（参考1）に示す。

### イ 慢性出血性貧血

消化管や泌尿生殖器からの、少量長期的な出血により時に高度の貧血を来す。この貧血は鉄欠乏性貧血であり、鉄剤投与で改善することから、日常生活に支障を來す循環器系の臨床症状（労作時の動悸・息切れ、浮腫など）がない場合には、原則として輸血を行わない。慢性的貧血であり、体内的代償機構が働くために、これらの症状が出現することはまれであるが、前記症状がある場合には2単位の輸血を行い、臨床所見の改善の程度を観察する。全身状態が良好な場合は、ヘモグロビン（Hb）値6g/dL以下が一つの目安となる。その後は原疾患の治療と鉄剤の投与で経過を観察する。

### 2) 急性出血に対する適応（主として外科的適応）

急性出血には外傷性出血のほかに、消化管出血、腹腔内出血、気道内出血などがある。消化管出血の原因是胃十二指腸潰瘍、食道靜脈瘤破裂、マオリーオイス症候群、悪性腫瘍

からの出血などがあり、腹腔内出血の原因疾患には原発性あるいは転移性肝腫瘍、肝臓や脾臓などの実質臓器破裂、子宮外妊娠、出血性肺炎、腹部大動脈や腸間膜動脈の破裂などがある。

急速出血では、Hb値低下（貧血）と、循環血漿量の低下が発生していく。循環動態から見ると、循環血漿量の15%の出血（class I）では、輕い末梢血管収縮あるいは頸脈を除くと循環動態にはほとんど変化は生じない。また、15~30%の出血（class II）では、頸脈や脈圧の狭小化が見られ、患者は落着きがなくなり不安感を呈するようになる。さらに、30~40%の出血（class III）では、その症状は更に顎著となり、血圧も低下し、精神状態も錯乱する場合もある。循環血漿量の40%を超える出血（class IV）では、昏睡傾向となり、生命にも危険な状態とされていく<sup>1)</sup>。

貧血の面から、循環血液が正常な場合の急性貧血に対する耐性についての明確なエビデンスはない。Hb値が10g/dLを超える場合は輸血を必要とするとはないが、6g/dL以下では輸血はほぼ必須とされている<sup>2)</sup>。特に、急速に貧血が進行した場合はその傾向は強い。Hb値が6~7g/dLの時の輸血の必要性は患者の状態や合併症によって異なるので、Hb値のみで輸血の開始を決定することは適切ではない。

### 3) 手術期の輸血

一般的な開腹期の輸血の適応の原則を以下に示す。なお、各科の手術における輸血療法の注意点を巻末に付する（参考2~10）。

#### (1) 術前投与

術前の貧血は必ずしも投与の対象とはならない。慣習的に行われてきた術前投与のいわゆる10/30ルール（Hb値10g/dL、ヘマトクリット（Ht）値30%以上にすること）は近年では根拠のないものとされている。したがって、患者の心肺機能、原疾患の種類（良性又は悪性）、患者の年齢や体重あるいは特殊な病態等の全身状態を把握して投与の必要性の有無を決定する。

なお、慢性貧血の場合には内科的適応と同様に対処する。  
一般に貧血のある場合には、循環血漿量を増加しているため、投与により急速に貧血のは正を行うと、心原性の肺水腫を引き起こす危険性がある。術前投与は、持続する出血がコントロールできない場合又はその恐れがある場合には内科的適応とする。

慢性貧血患者に対する輸血の適応を判断する際は、慢性貧血患者における代償反応（参考11）を考慮に入れるべきである。そして、手術を安全に施行するために必要と考えられるHt値の最低値（参考12）も、患者の全身状態により異なることを留意すべきである。

また、消化器系統の悪性腫瘍が多い我が国では、術前の患者は貧血とともにしばしば末

養障害による低たん白症を伴っているが、その場合には術前に栄養管理（中心静脈栄養法、経腸栄養法など）を積極的に行い、その是正を図る。

### (2) 術中投与

手術中の出血に対して必要となる輸血について、予め術前に判断して準備する（参考15）。さらに、ワルファリンなどの抗凝固薬が投与されている場合などでは、術前の抗凝固・抗血小板療法について、いつの時点で中断するかなどを判断することも重要である（参考16）。術中の出血に対して出血量の削減（参考15）に努めるとともに、循環血液に対する出血量の割合と臨床所見に応じて、原則として以下のような成分輸血により対処する（図1）。全身状態の良好な患者で、循環血液量の15～20%の出血が起こった場合には、細胞外液量の補充のために細胞外液補充液（乳酸リソカルボン酸、酢酸リソカルボン酸など）を出血量の2～3倍投与する。

循環血液量の20～50%の出血量に対しては、膠質最適圧を維持するために、人工膠質液（ヒドロキシエチルデンプン（HES）、デキストランなど）を投与する。赤血球不足による組織への酸素供給不足が懸念される場合には、赤血球液を投与する。この程度までの出血では、等張アルブミン製剤（5%人血清アルブミン又は加熱人血漿たん白）の併用が必要となることは少ない。

\*通常は20mL/kgとなっているが、急速・多量出血は救命のためにさらに入量を増加することが必要な場合もある。この場合、注入された人工膠質液の一部は体外に流出していることにも留意すると、20mL/kgを超えた注入量も可能である。

循環血液量の50～100%の出血では、細胞外液補充液、人工膠質液及び赤血球液の投与だけでは血清アルブミン濃度の低下による肺水腫や乏尿が出現する危険性があるので、適宜等張アルブミン製剤を投与する。なお、人工膠質液を1,000mL以上必要とする場合にも等張アルブミン製剤の使用を考慮する。


さらに、循環血液量以上の大出血（24時間以内に100%以上）時又は100mL/分以上の急速輸血をするような事態には、凝固因子や血小板数の低下による出血傾向（希釀生の凝固障害と血小板減少）が起こる可能性があるので、凝固因子や血小板数の検査値及び臨床的な出血傾向を参考にして、新鮮凍結血漿や血小板濃厚液の投与も考慮する（新鮮凍結血漿及び血小板の使用指針の真を参照）。この間、血圧・脈拍数などのバイタルサインや尿量、心電図・血算、さらには血液ガスなどの所見を参考にして必要な血液成分を追加する。収縮期血圧を90mmHg以上、平均血圧を60～70mmHg以上に維持し、一定の尿量（0.5～1mL/kg/時）を確保できるように輸液・輸血の管理を行う。

通常はHb値が7～8g/dL程度であれば十分な酸素の供給が可能であるが、冠動脈疾患などの心疾患あるいは肝機能障害や脳循環障害のある患者では、Hb値を10g/dL程度に維持する

ことが推奨される。

なお、循環血液量に相当する以上の出血量がある場合には、可能であれば回収式自己血輸血を試みるよう努める。

図1 出血患者における輸液・成分輸血療法の適応



### (3) 術後投与

術後の1～2日間は創部からの間質液の漏出やたん白質化の亢進により、細胞外液量と血清アルブミン濃度の減少が見られることがある。ただし、バイタルサインが安定している場合は、細胞外液補充液の投与以外に赤血球液、等張アルブミン製剤や新鮮凍結血漿などの投与が必要となる場合は少ないが、これらを投与する場合には各成分製剤の使用指針によるものとする。急速に貧血が進行する術後出血の場合の赤血球液の投与は、早急に外科的止血処置とともに行う。

### 3. 投与量

赤血球液の投与によって改善されるHb値は、以下の計算式から求めることができます。  
予測上昇出血量 (g/dL)

=投与 Hb 量 (g) /循環血液量 (dL)

循環血液量 : 70mL/kg [循環血液量 (dL)]

=体重 (kg) × 70mL/kg/100]

例えば、体重 30kg の成人、(循環血液量 35dL) に Hb 値 19g/dL の血液を 2 単位 (400mL) 由來の赤血球液-LR (「日赤」) の容量は約 280mL である。したがって、1 パック中の含有 Hb 量は約 19g/dL × 280/100 dL = 約 53g となる) 輸血することにより、Hb 値は約 1.5g/dL 上昇することになる。

#### 4. 効果の評価

投与の妥当性、選択した投与量の効率性あるいは副作用の予防対策などの評価に當するため、赤血球液の投与前には、投与が必要な理由と必要な投与量を明確に把握し、投与後には投与前後の検査データと臨床所見の改善の程度を比較して評価するとともに、副作用の有無を観察して、診療録に記載する。

#### 5. 不適切な使用

1) 濃縮因子の補充を目的とした新鮮凍結血漿との併用  
赤血球液と新鮮凍結血漿を併用して、全血の代替とすべきではない。その理由は、実際には凝固異常を認める症例は極めて限られていることや、このような併用では輸血単位数が増加し、感染症の伝播や同種免疫反応の危険性が増大するからである（新鮮凍結血漿の使用指針の項を参照）。

#### 2) 末期患者への投与

末期患者に対しては、患者の自由意思を尊重し、単なる延命措置は控えるべきである。方が容認されつつある。輸血療法といえども、その例外ではなく、患者の意思を尊重しない単なる時間的延命のための投与は控えるべきである。

#### 6. 使用上の注意点

##### 1) 使用法

赤血球液を使用する場合には、輸血セットを使用する。なお、日本赤十字社から供給される赤血球液はすべて白血球除去剤となつており、ベッドサイドでの白血球除去フィルターの使用は不要である。また、通常の輸血では加温の必要はないが、急速大量輸血、新生児交換輸血等の際には専用加温器 (37°C) で加温する。

#### 2) 感染症の伝播

赤血球液の投与により、血液を介する感染症の伝播を伴うことがある。  
細胞混入による致死的な合併症に留意し、輸血の実施前にパック内の血液について色調の変化、溶血（黒色化）や凝血塊の有無、又はパックの破損や開封による開鎖系の破綻等の異常がないことを肉眼で確認する。特に低温で増殖するエルシニア菌 (*Yersinia enterocolitica*)、セラチア菌などの細菌感染に留意してパック内セグメント内の血液色調の差にも留意する。

#### 3) 鉄の過剰負担

1 単位 (200mL 由来) の赤血球液中には、約 100mg の鉄が含まれている。人気から 1 日に排泄される鉄は 1mg であることから、赤血球液の頻回投与は体内に鉄の沈着を来し、鉄過剰症を生じる。また、Hb IgG はビリルビン 40mg に代謝され、そのまま半量は血管外に速やかに拡散するが、肝障害のある患者では、投与後の遅発地の負荷が黄疸の原因となり得る。

#### 4) 輸血後移植片対宿主病 (PT-GVHD) の予防対策

輸血後移植片対宿主病の発症を防止するために、原則として放射線を照射 (15~50Gy) した赤血球液を使用する<sup>4)</sup>。平成 10 年に日本赤十字社より放射線照射血液製剤が供給されるようになり、平成 12 年以降、我が国では放射線照射血液製剤による輸血後移植片対宿主病の確定症例の報告はない。なお、採血後 14 日保存した赤血球液の輸血によっても致死的な合併症である輸血後移植片対宿主病の発症例が報告されていることから、採血後の期間にかかるらず、原則として放射線を照射 (15~50Gy) した血液を使用する。また、現在ではすべての薬剤が保存前白血球除去となつたが、保存前白血球除去のみによつて輸血後移植片対宿主病が予防できるとは科学的に証明されていない。

#### 5) 高カリウム血症

赤血球液では、放射線照射の有無にかかわらず、保存に伴い上清中のカリウム濃度が上昇する場合がある。また、放射線照射後の赤血球液では、照射していない赤血球液よりも上清中のカリウム濃度が上昇する。そのため、急速輸血時、大量輸血時、腎不全患者あるいは低出生体重児などへの輸血時には高カリウム血症に注意する。

#### 6) 溶血性副作用

ABO 血液型の取り違いにより、致命的な溶血性的副作用を来すことがある。投与直前には、患者氏名 (同姓同名患者では ID 番号や生年月日など)・血液型・その他の状況についての

照合を、必ずバッキングごとに細心の注意を払った上で実施する（輸血療法の実施に関する指針を参照）。

- 7) 非溶血性副作用  
発熱反応、アレルギーあるいはアナフィラキシー反応を繰り返し起こす場合は、洗浄赤血球剤が適応となる場合がある。

#### 8) ABO 血液型・Rh 型と交差適合試験

原則として、ABO 同型の赤血球製剤を使用するが、緊急の場合には異型適合血の使用も考慮する（輸血療法の実施に関する指針を参照）。また、Rh 陽性患者に Rh 隱性赤血球製剤を使用しても抗原抗体反応をおこさないので投与するこある。

9) サイトメガロウイルス (CMV) 抗体陰性赤血球液  
CMV 抗体陰性的妊娠、あるいは極低出生体重児に赤血球輸血をする場合には、CMV 抗体陰性の赤血球液を使用することが望ましい。造血幹細胞移植時に患者とドナーの両者が CMV 抗体陰性の場合には、CMV 抗体陰性の赤血球液を用意する。なお、現在、保存前白球除去赤血球液が供給されており、CMV にも有用とされている。

### III 血小板濃厚液の適正使用

#### 1. 目的

血小板輸血は、血小板数の減少又は機能の異常により重篤な出血ないし出血の予測される病態に対して、血小板成分を補充することにより止血を図り（治療的投与）、又は出血を防止すること（予防的投与）を目的とする。  
なお、血小板濃厚液 (Platelet Concentrate; PC) の製法と性状については参考 16 を参照。

#### 2. 使用指針 ①～③

血小板輸血の適応は、血小板数、出血症状の程度及び合併症の有無により決定することを基本とする。  
特に、血小板数の減少は重要ではあるが、それのみから安易に一律に決定すべきではない。出血ないし出血傾向が血小板数の減少又は機能異常にによるものではない場合（特に血管損傷）には、血小板輸血の適応とはならない。  
なお、本指針に示された血小板数の閾値はあくまでも目安であって、すべての症例に一致するものではないことに留意すべきである。  
血小板輸血を行う場合には、必ず事前に血小板数を測定する。  
血小板輸血の適応を決定するに当たって、血小板数と出血症状の大略の関係を理解しておく必要がある。

一般に、血小板数が 5 万/ $\mu\text{L}$  以上では、血小板減少による重篤な出血を認めるることはなく、したがって血小板輸血が必要となることはない。  
血小板数が 2～5 万/ $\mu\text{L}$  では、時に出血傾向を認めることがあり、止血困難な場合には血小板輸血が必要となる。  
血小板数が 1～2 万/ $\mu\text{L}$  では、時に重篤な出血をみることがあり、血小板輸血が必要となる場合がある。血小板数が 1 万/ $\mu\text{L}$  未満ではしばしば重篤な出血をみることがあるため、血小板輸血を必要とする。  
しかし、慢性に経過している血小板減少症（再生不良性貧血など）で、他に出血傾向を来す合併症がなく、血小板数が安定している場合には、血小板数が 5 千～1 万/ $\mu\text{L}$  であっても、血小板輸血なしで重篤な出血を来すこととはまれなことから、血小板輸血は強力避けるべきである（f. (2) 参照）。

なお、出血傾向の原因は、単に血小板数の減少のみではないことから、必要に応じて凝固・凝溶系の検査などを行う。

文献  
1) American College of Surgeons:Advanced Trauma Life Support Course Manual. American College of Surgeons 1997;103-112

2) American Society of Anesthesiologists Task Force:Practice guideline for blood component therapy. Anesthesiology 1996;84:732-742

3) Lundsgaard-Hansen P, et al:Component therapy of surgical hemorrhage:Red cell concentrates, colloids and crystalloids. Bibl Haematol 1980;46:147-169

4) 日本輸血学会「輸血後 GVHD 対策小委員会」報告：輸血による GVHD 対策のための血液に対する放射線照射ガイドライン IV. 日本輸血学会会告 VII, 日輸血会誌 1999; 45: 47-54

a. 活動性出血  
血小板減少による重篤な活動性出血を認める場合（特に網膜、中枢神経系、肺、消化管などの出血）には、原疾患の治療を十分に行うとともに、血小板数を5万/ $\mu\text{L}$ 以上に維持するように血小板輸血を行う。

b. 外科手術の術前状態

待機的手術患者あるいは腰椎穿刺、硬膜外麻酔、経気管支挿管、肝生検などの侵襲を伴う処置では、術前あるいは施行前の血小板数が5万/ $\mu\text{L}$ 以上であれば、通常は血小板輸血を必要とする。また、骨髓穿刺や抜歯など局所の止血が容易な手技は血小板数を1~2万/ $\mu\text{L}$ 程度で安全に施行できる。更蓋内の手術のように局所での止血が困難な特殊な領域の手術では、7~10万/ $\mu\text{L}$ 未満では、手術の内容により、血小板濃厚液の準備又は術直前の血小板輸血の可否を判断する。その際、血小板数の減少を来す基礎疾患があれば、術前にその治療を行う。

慢性の腎臓や肝臓の疾患で出血傾向を伴う患者では、手術により大量の出血をみることがある。出血傾向の原因を十分に検討し、必要に応じて血小板濃厚液の準備又は術直前から、血小板輸血も考慮する。

c. 人工心肺使用手術時の周術期管理

心臓手術患者の術前状態については、待機的手術患者と同様に考えて対処する。人工心肺使用時にみられる血小板減少は、通常人工心肺の使用時間と比例すると言われている。また、血小板減少は術後1~2日で最もなるが、通常は3万/ $\mu\text{L}$ 未満になることはまれである。

術中・術後を通して血小板数が3万/ $\mu\text{L}$ 未満に低下している場合には、血小板輸血の適応である。ただし、人工心肺離脱後の硫酸アロダミン投与後に血算及び凝固能を適宜検査、判断しながら、必要に応じて5万/ $\mu\text{L}$ 程度を目処に血小板輸血開始を考慮する。なお、複雑な心大血管手術で長時間（3時間以上）の人工心肺使用例、再手術などで広範な血管剥離を要する例、及び慢性的腎臓や肝臓の疾患で出血傾向をみる例の中には、人工心肺使用後に血小板減少あるいは機能異常によると考えられる止血困難な出血（oozingなど）をみるとがある。凝固因子の欠乏を伴わず、このような病態を呈する場合には、血小板数が5万/ $\mu\text{L}$ ~10万/ $\mu\text{L}$ になるように血小板輸血を行う。

d. 大量輸血時

急速失血により24時間以内に循環血液量相当量、特に2倍量以上の大量輸血が行われると、血液の希釈により血小板数の減少や機能異常のために、細血管性の出血を来すことがある。止血困難な出血症状とともに血小板減少を認める場合には、血小板輸血の適応となる。

e. 撫養性血管内凝固（Disseminated Intravascular Coagulation; DIC）

出血傾向の強く現れる可能性のあるDIC（基礎疾患が白血病、癌、産科的疾患、重症感染症など）で、血小板数が急速に5万/ $\mu\text{L}$ 未満へと低下し、出血症状を認める場合には、血小板輸血の適応となる。DICの他の治療とともに、必要に応じて新鮮凍結血漿も併用する。なお、血栓による臓器症状が強く現れるDICでは、血小板輸血には慎重であるべきである。

f. 血液疾患  
頻回・多量の血小板輸血を要する場合が多いことから、同種抗体の产生を予防する方策

(① DICの診断基準については参考資料1を参照)

(1) 造血器腫瘍

急性白血病・悪性リンパ腫などの覚解導入療法においては、急速に血小板数が低下していくので、定期的に血小板数を測定し、血小板数が1~2万/ $\mu\text{L}$ 未満に低下してきた場合には血小板数を1~2万/ $\mu\text{L}$ 以上に維持するよう、計画的に血小板輸血を行う。とくに、急性白血病においては、安定した状態（発熱や重症感染症などを合併していない）であれば、血小板数を1万/ $\mu\text{L}$ 以上に維持すれば十分とされる<sup>④~⑥</sup>。

抗HLA抗体が存在しなくとも、発熱、感染症、腫脹大、DIC、免疫複合体などの存在する場合には、血小板の輸血後回収率・半減期は低下する。従って血小板数を2万/ $\mu\text{L}$ 以上に保つためには、より頻回あるいは大量の血小板輸血を必要とすることが多いが、時には血小板輸血不応状態となることもある。

(2) 再生不良性貧血・骨髓異形成症候群

これらの疾患では、血小板減少は慢性に経過することが多く、血小板数が5千/ $\mu\text{L}$ 以上あつて出血症状が及下出血症度の僅微な場合には、血小板輸血の適応とはならない。血小板抗体の產生を考慮し、安易に血小板輸血を行うべきではない。

しかし、血小板数が5千/ $\mu$ l前後ないしそれ以下に低下する場合には、重篤な出血をみる頻度が高くなるので、血小板輸血の適応となる。血小板輸血を行い、血小板数を1万/ $\mu$ l以上に保つように努めるが、維持が困難なこともある。

なお、感染症を合併して血小板数の減少をみる場合には、出血傾向が増強することが多いので、(1)の「造血器腫瘍」に準じて血小板輸血を行う。

(3) 免疫性血小板減少症  
特発性血小板減少性紫斑病 (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura; ITP) は、通常は血小板輸血の対象とはならない。ITPで外科的処置を行う場合には、輸血による血小板数の増加は期待できないことが多いが、まずステロイド剤あるいは静注用免疫グロブリン製剤の投与を行う。これらの薬剤の効果が不十分で大量出血の予測される場合には、血小板輸血の適応となる。また、ITPの母親から生まれた新生児で重篤な血小板減少症をみるとともに血小板輸血のほか、ステロイド剤又は静注用免疫グロブリン製剤の投与とともに血小板輸血を必要とすることがある。

血小板特異抗原の母児間不適合による新生児同種免疫性血小板減少症 (Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia ; NATI) で、重篤な血小板減少をみる場合には、血小板特異抗原同型の血小板輸血を行う。このような血小板濃厚液が入手し得ない場合には、母親由来の血小板の輸血が有効である。

(4) 血栓性血小板減少性紫斑病 (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura; TTP) 及び溶血性尿毒症症候群 (Hemolytic Uremic Syndrome; HUS)  
TTPとHUSでは、血小板輸血により症状の悪化をみるとあるので、原則として血小板輸血の適応とはならない。

(5) 血小板機能異常症  
血小板機能異常症（血小板無力症、抗血小板療法など）での出血症状の程度は症例によって様々であり、また、血小板同種抗体産生の可能性もあることから、重篤な出血ないし止血困難な場合のみ血小板輸血の適応となる。

(6) その他：ヘパリン起因性血小板減少症 (Heparin induced thrombocytopenia; HIT)

HITが強く疑われる若しくは確定診断された患者において、明らかな出血症状がない場合には予防的血小板輸血は避けるべきである。

#### g. 固形腫瘍

固形腫瘍に対して強力な化学療法を行う場合には、急速に血小板数が減少することがあるので、必要に応じて適宜血小板数を測定する。  
血小板数が2万/ $\mu$ l未満に減少し、出血傾向を認める場合には、血小板数が1~2万/ $\mu$ l以上を維持するよう血小板輸血を行う。  
化学療法の中止後に、血小板数が輸血のためではなく2万/ $\mu$ l以上に増加した場合には、回復期に入ったものと考えられることから、それ以降の血小板輸血は不要である。

h. 造血幹細胞移植 (骨髄移植等)  
造血幹細胞移植後に骨髄機能が回復するまでの期間は、血小板数が1~2万/ $\mu$ l以上を維持するよう計画的に血小板輸血を行う。  
出血症状があれば血小板輸血を追加する。

※ 出血予防の基本的な適応基準  
造血機能を高めに低下させる前処置を用いた造血幹細胞移植後は、血小板数が減少するので、出血予防のために血小板濃厚液の輸血が必要となる。血小板数が減少は血小板数と臨床症状を参考に決める。通常、出血予防のために血小板数が1~2万/ $\mu$ l未満の場合が血小板輸血の適応となる。ただし、感染症、発熱、播種性血管内凝固などの合併症がある場合には出血傾向の増強することがあるので、血小板数を測定し、その結果により当日の血小板濃厚液の適応を判断することが望ましい（トリガーリン血）。ただし、連日の採血による患者への負担を考慮し、また、典型的な造血幹細胞移植では血小板が減少する期間があるので、週単位での血小板濃厚液の輸血を計画できる場合が多い。この場合は、1週間に2~3回の頻度で輸血を行う。

- i. 血小板輸血不応状態 (HLA適合血小板輸血)  
血小板輸血後に血小板数の増加しない状態を血小板輸血不応状態という。  
血小板数の増加しない原因には、同種抗体などの免疫学的機序によるものと、発熱、感染症、DIC、脾腫大などの非免疫学的機序によるものがある。  
免疫学的機序による不応状態の大部分は抗-HLA抗体によるもので、一部に血小板特異抗体が関与するものがある。

抗HLA抗体による血小板輸血不応状態では、HLA適合血小板濃厚液を輸血すると、血小板数の増加をみるとが多い。自血病、再生不良性貧血などで通常の血小板濃厚液を輸血し、輸血翌日の血小板数の増加がみられない場合には、輸血翌日の血小板数を測定し、増加が2回以上にわたってほとんど認められず、抗HLA抗体が検出される場合には、HLA適合血小板輸血の適応となる。

なお、抗HLA抗体は経過中に陰性化し、通常の血小板濃厚液が有効となることがあるので、経時的に検査することが望まれる。

HLA適合血小板濃厚液の供給には特定の供血者に多大な負担を課すことから、その適応に当たっては適切かつ慎重な判断が必要である。  
非免疫学的機序による血小板輸血不応状態では、原則としてHLA適合血小板輸血の適応はない。

HLA適合血小板濃厚液が入手し得ない場合や無効の場合、あるいは非免疫学的機序による血小板輸血不応状態にあり、出血を認める場合には、通常の血小板濃厚液を輸血して経過を見る。

### 3. 授与量

患者の血小板数、循環血液体量、重症度などから、目的とする血小板数の上昇に必要とされる授与量を決める。血小板輸血直後の予測血小板增加数(μL)は次式により算出する。

$$\text{予測血小板增加数} (\mu\text{L}) = \frac{\text{輸血血小板総数} (\text{ml}) \times 10^3}{\text{循環血液体量} (\text{ml}) \times 10^3} \times \frac{2}{3}$$

(2/3は輸血された血小板が脾臓に捕捉されるための補正係数)  
(循環血液体量は70mL/kgとする)

例えば、血小板濃厚液5単位(1.0×10<sup>11</sup>個以上の血小板を含有)を循環血液体量5,000mL(体重71kg)の患者に輸血すると、直後には輸血前の血小板数より13,500/μL以上増加することが見込まれる。

なお、一回授与量は、原則として上記計算式によるが、実務的には通常10単位が使用されている。体重25kg以下の小児では10単位を3~4時間かけて輸血する。

### 4. 効果の評価

血小板輸血実施後には、輸血効果について臨床症状の改善の有無及び血小板数の増加の程度を評価する。

血小板数の増加の評価は、血小板輸血後約1時間又は翌朝か24時間後の補正血小板增加数(corrected count increment; CCI)により行う。CCIは次式により算出する。

$$CCI (\mu\text{L}) = \frac{\text{輸血血小板增加数} (\mu\text{L}) \times \text{体表面積} (\text{m}^2)}{\text{輸血血小板総数} (\times 10^{11})}$$

### 5. 不適切な使用

末期患者に対しては、患者の自由意思を尊重し、單なる延命処置は控えるという考え方が容認されつつある。輸血療法といえどもその例外ではなく、患者の意思を尊重しない单なる時間的延命のための投与は控えるべきである。

### 6. 使用上の注意点

#### 1) 使用法

血小板濃厚液を使用する場合には、血小板輸血セットを使用することが望ましい。赤血球や血漿製剤の輸血に使用した輸血セットを引き続き血小板輸血に使用すべきではない。なお、血小板濃厚液はすべて保存前白血球除去製剤となつており、ベッドサイドでの白血球除去フィルターの使用は不要である。

2) 感染症の伝播

血小板濃厚液はその機能を保つために室温(20~24°C)で水平振盪しながら保存されているために、細菌混入による致死的な合併症に留意して、輸血の実施前にバッグ内の血液についてスワーリングの有無、色調の変化、集塊の有無(青色ブドウ球菌等の細菌混入により凝塊が発生する場合がある)、又はバッグの破損や開封による閉鎖系の破綻等の異常がないことを肉眼で確認する。(なお、スワーリングとは、血小板製剤を螢光灯等にかざしながらゆっくりと攪拌したとき、品質が確保された血小板濃厚液では渦巻き状のペターンがみられる現象のこと。pHの低下や低体温等によりスワーリングが弱くなることが

- ある。
- 3) 骨髄後移植片対宿主病 (PT-GVHD) の予防対策
- 輸血後移植片対宿主病 (PT-GVHD) の発症を防止するため、原則として放射線を照射(15～50Gy) した血小板濃厚液を使用する。
- 4) サイトメガロウイルス (CMV) 抗体陰性血小板濃厚液
- CMV 抗体陰性的妊娠、あるいは極低出生体重児に血小板輸血をする場合には、CMV 抗体陰性の血小板濃厚液を使用することが望ましい。
- 5) HLA 適合血小板濃厚液
- HLA 適合血小板濃厚液に対して有効な場合が多く、ABO 同型の血小板濃厚液を使用することが望ましい。なお、血小板輸血不応状態には、血小板特異抗体内によるものもある。
- 6) ABO 血液型・Rh 型と交差適合試験
- 原則として、ABO 血液型の同型の血小板濃厚液を使用する。現在供給されている血小板濃厚液は赤血球をほとんど含まないので、交叉適合試験を省略してもよい。
- 患者が Rh 陰性の場合は、Rh 陰性の血小板濃厚液を使用することが望ましく、特に妊娠可能な女性では推奨される。しかし、緊急の場合には、Rh 陽性の血小板濃厚液を使用してもよい。この場合には、高力価抗 Rh 免疫グロブリン (RHIG) を投与することにより、抗 D 抗体の産生を予防できる場合がある。
- 通常の血小板輸血の効果がなく、抗 HLA 抗体が認められる場合には、HLA 適合血小板濃厚液を使用する。
- 7) ABO 血液型不適合輸血
- ABO 血液型同型血小板濃厚液が入手困難な場合は ABO 血液型不適合の血小板濃厚液を使用する。この場合、血小板濃厚液中の A、抗 B 抗体による溶血の可能性に注意する。また、患者の抗 A、抗 B 抗体価が極めて高い場合には、ABO 血液型不適合血小板輸血では十分な効果が期待できないことがある。
- 文獻
- 1) British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force: Guidelines for the use of platelet transfusions. Br J Haematol 2003;122:10-23
  - 2) Schiffer CA, et al: Clinical Practice Guidelines of the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 2001;19:1519-1538
  - 3) A Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Blood Component Therapy: Practice Guidelines for Blood Component Therapy. Anesthesiology 1996; 84: 732-747
  - 4) Vandit H, et al: Safety and cost effectiveness of a  $10 \times 10^9$  / L trigger for prophylactic platelet transfusions compared with the traditional  $20 \times 10^9$  / L trigger : a prospective comparative trial in 105 patients with acute myeloid leukemia. Blood 1998;91:3601-3606
  - 5) Rebulla P, et al: The threshold for prophylactic platelet transfusions in adults with acute myeloid leukemia. Gruppo Italiano Malattie Ematologiche Maligne dell'Adulto. N Engl J Med 1997;337:1870-1875
  - 6) Heckman JD, et al: Randomized study of prophylactic platelet transfusion threshold during induction therapy for adult acute leukemia: 10,000 / microl. J Clin Oncol 1997;15: 1143-1149
  - 7) Bersus O, Boman K, Nessen SC, Weiszberg LA: Risk of hemolysis due to anti-A and anti-B caused by the transfusion of blood or blood components containing ABO-incompatible plasma. Transfusion, 53:114S-123S, 2013

## IV 新鮮凍結血漿の適正使用

### 1. 目的

新鮮凍結血漿 (Fresh Frozen Plasma;FFP) の投与は、凝固因子の欠乏による病態の改善を目的に行う。特に、凝固因子を補充することにより、出血の予防や止血の促進効果（予防的投与と治療的投与）をもたらすことがある。

なお、新鮮凍結血漿の製法と性状については参考17を参照。

### 2. 使用指針

凝固因子の補充による治療的投与を主目的とする。自然出血時、外傷性の出血時の治療と凝血的処置を行う際に適応となる。凝血的処置時を除いて新鮮凍結血漿の予防的投与の意味ではなく、あくまでもその使用は治療的投与に限定される。投与量や投与間隔は各凝固因子の必要な止血レベル、生体内の半減期や回収率などを考慮して決定し、治療効果の判定は臨床所見と凝固活性の検査結果を総合的に勘案して行う。新鮮凍結血漿の投与は、他に安全で効果的な血漿分画製剤あるいは代替医薬品（リコンビナント製剤など）がな場合のみ、適応となる。投与に当たっては、投与前にプロトロンビン時間（PT）、活性化部分トロンボプラスチック時間（APTT）を測定し、DIC等の大量出血ではフィブリノゲン値も測定する。また、新鮮凍結血漿の予防的投与は、凝固因子欠乏による出血のある患者の凝血的処置時を除き、その有効性は証明されていない（本項末尾「注」；出血に対する輸血療法」を参照）。したがって、新鮮凍結血漿の適応は以下に示す場合に限定される。

- 1) 凝固因子の補充
  - (i) PT及び/又は APTT が延長している場合 (①PTは(i) INRは(i) 30%以下 /②APTTは(i) 各医療機関における基準の上限の2倍以上, (ii) 25%以下とする)

#### i. 複合型凝固障害

- 肝障害：肝障害により複数の凝固因子活性が低下し、出血傾向のある場合に適応となる。新鮮凍結血漿の治療効果はPTやAPTTなどの凝固検査を行いつつ評価するが、検査値の正常化を目標とするのではなく症状の改善により判定する。ただし、重症肝障害における止血系の異常は、凝固因子の産生低下ばかりではなく、血小板数の減少や抗凝固因子、線溶因子、抗線溶因子の産生低下、網内系の機能の低下なども原因となり得ることに留意する。また、急性肝不全においては、しばしば消費性凝固障害により新鮮凍結血漿の必要投与量が増加する。容量の過負荷が懸念される場合には、血漿交換療法 (1~1.5×體液量)

漿量/回) を併用する (アフェレシスに開連する事項は、参考14を参照)。

なお、PTがINR 2.0以上 (30%以上) で、かつ凝血的処置を行う場合は除いて新鮮凍結血漿の予防的投与の適応はない。ただし、手術以外の凝血的処置における重大な出血の発生は、凝固障害よりも手技が主な原因となると考えられていることに留意する。

- L-アスパラギナーゼ投与関連：肝臓での産生低下によるフィブリノゲンなどの凝固因子の減少により出血傾向をみるとあるが、アンチトロンビンなどの抗凝固因子や線溶因子の産生低下をも来すことから、血栓症を見る場合もある。これらの群因子を同時に補給するためにには新鮮凍結血漿を用いる。アンチトロンビンの回復が悪い時は、アンチトロンビン製剤を併用する。

止血系の異常の程度と出現した時期により L-アスパラギナーザの投与計画の中止若しくは変更を検討する。

- 摘穢性血管内凝固 (DIC) : DIC (診断基準は参考資料1を参照) の治療の基本は、原因の除去 (基礎疾患の治療) とヘパリンなどによる抗凝固療法である。新鮮凍結血漿の投与は、これららの処置を前提として行われるべきである。この際の新鮮凍結血漿投与は、凝固因子と共に不足した生理的凝固・線溶阻害因子 (アンチトロンビン、プロテインC、プロテインS、プラスミンインヒビターなど) の同時補給を目的とする。通常、(1) に示すPT、APTT の延長のほかフィブリノゲン値が 100mg/dl 未満の場合に新鮮凍結血漿の適応となる (参考資料1 DICの診断基準参照)。

なお、フィブリノゲン値は 100mg/dL 程度まで低下しなければPTやAPTTが延長しないこともあります。また、特にアンチトロンビン活性が低下する場合は、新鮮凍結血漿より安全かつ効果的なアンチトロンビン濃縮血漿分画製剤の使用を常に考慮する。

- 大量輸血時：通常、大量輸血時に希釈性凝固障害による止血困難が起ることがあり、その場合新鮮凍結血漿の適応となる。しかしながら、希釈性凝固障害が認められない場合は、新鮮凍結血漿の適応はない (図 1)。外傷などの救急患者では、消費性凝固障害が併存しているかを検討し、凝固因子欠乏による出血傾向があると判断された場合に限り、新鮮凍結血漿の適応がある。新鮮凍結血漿の予防的投与は行わない。

- ii. 濃縮製剤のない凝固因子欠乏症
  - 血液凝固因子欠乏症にはそれぞれの濃縮製剤を用いることが原則であるが、血液凝固第V、第X因子欠乏症に対する濃縮製剤は現在のことろ供給されていない。したがって、

これらの両因子のいずれかの欠乏症又はこれらを含む複数の凝固因子欠乏症では、出血症状を示しているか、観血的処置を行う際に新鮮凍結血漿が適応となる。第V因子の欠乏症（血友病A）は遺伝子組み換え型製剤、第IX因子欠乏症では濃縮剤、第IX因子欠乏症（血友病B）には遺伝子組み換え型製剤又は濃縮剤、第XIII因子欠乏症には濃縮剤、先天性無ファブリノゲン血症には濃縮ファブリノゲン製剤、第VII因子欠乏症には遺伝子組み換え活性第VII因子製剤又は濃縮プロトロンビン複合体製剤、プロトロンビン複合体製剤、第X因子欠乏症には濃縮プロトロンビン複合体製剤、さらにファン・ヴィレブランド病には、ファン・ヴィレブランド因子を含んでいる第VIII因子濃縮製剤による治療が可能であることから、いずれも新鮮凍結血漿の適応とはならない。

iii. クマリン系薬剤（ワルファリンなど）効果の緊急補正（PTがINR2.0以上（30%以下））  
● クマリン系薬剤は、肝での第II、VII、IX、X因子の合成に必須なビタミンK依存性酵素反応の阻害剤である。これらの凝固因子の欠乏状態における出血傾向は、ビタミンKの補給により通常1時間以内に改善が認められるようになる。なお、より緊急な対応のために新鮮凍結血漿の投与が必要になることがあるが、この場合でも直ちに使用可能な場合には「濃縮プロトロンビン複合体製剤」を使用することも考えられる。

(2) 低フィブリノゲン血症 (100mg/dL未満)  
我が国では濃縮ファブリノゲン製剤の供給が十分でなく、またクリオアブリシビテート製剤が供給されていないことから、以下の病態へのフィブリノゲンの補充には、新鮮凍結血漿を用いる。

なお、フィブリノゲン値の低下の程度はPTやAPTTに必ずしも反映されないので注意する（前述）。

● 播種性血管内凝固（DIC）：（前項 i DIC）を参照

● L-アスパラギナーゼ投与後：（前項 i アスパラギナーザ投与関連参照）

## 2) 凝固阻害因子や線溶因子の補充

● プロティンC、プロティンSやプラスミンインヒビターなどの凝固・線溶阻害因子欠乏症における欠乏因子の補充を目的として投与する。プロティンCやプロティンSの欠乏症における血栓症の発症時にはヘパリンなどの抗凝固療法を併用し、必要に応じて新鮮凍結血漿により欠乏因子を補充する。安定期には経口抗凝固療法により血栓症の発生を予防する。アンチトロンビンについては濃縮製剤を利用する。また、プロティンC欠乏症における血栓症発症時には活性型プロティンC濃縮製剤による治療が可能である。プラスミンイ

ンヒビターの欠乏による出血症状に対してはトランキサム酸などの抗凝固薬を併用し、効果が不十分な場合には新鮮凍結血漿を投与する。

## 3) 血漿因子の補充 (PT及びAPTTが正常な場合)

- 血栓性血小板減少性紫斑病 (ITP)：血管内皮細胞で產生される分子量の著しく大きい（unusually large）ファン・ヴィレブランド因子マルチマー（UL-vWF）が、微小血栓で血小板栓を生じさせ、本症を発症すると考えられている。通常、UL-vWFは同細胞から血中に放出される際に、肝臓で產生されるvWF特異的メタプロテアーゼ（例名 ADAMTS13）により、本来の止血に必要なサイズに分解される。しかし、後天性TTPではこの酵素に対する自己抗体（インヒビター）が発生し、その活性が著しく低下する。従って、本症に対する新鮮凍結血漿を置換液とした血漿交換療法（1～1.5 循環血漿量/回）の有用性は（1）同インヒビターの除去、（2）同酵素の補給、（3）UL-vWFの除去、（4）止血に必要な正常サイズvWFの補給、の4点に集約される。一方、先天性TTPでは、この酵素活性の欠損に基づくので、新鮮凍結血漿の単独投与で充分な効果がある<sup>11</sup>。なお、腸管出血性大腸菌O-157:H7感染に代謝される後天性溶血性尿毒症候群（HUS）では、その多くが前記酵素活性に異常を認めないため、新鮮凍結血漿を用いた血漿交換療法は必ずしも有効ではない<sup>12</sup>。

## 3. 投与量

- 生理的な止血効果を期待するための凝固因子の最少の血中活性値は、正常値の20～30%程度である（表1）
- 循環血漿量を40mL/kg (70mL/kg (1-Ht/100))とし、補充された凝固因子の血中回収率は目的とする凝固因子により異なるが、100%とすれば、凝固因子の血中レベルを約20～30%上昇させるのに必要な新鮮凍結血漿量は、理論的には8～12mL/kg (40mL/kg の20～30%)である。したがって、体重50kgの患者における新鮮凍結血漿の投与量は400～600mLである。日本赤十字社から供給される白血球を除去した全血採血由来製剤（第鮮凍結血漿-LR「日本赤」）の容量は、従来製剤の約1.5倍（200mL採血由来 (PPF-LR120) では約120mL, 400mL採血由来 (PPF-LR240) では約240mL）であるため、200mL採血由来 (PPF-LR120) の場合は約4～5本分に、400mL採血由来 (PPF-LR240) では約2～3本分に相当することとなる。また、成分採血由来製剤 (PPF-LR480) は容量が480mLであるため、約1本分に相当する。患者的体重やtt値（貧血時）、残存している凝固因子のレベル、補充すべき凝固因子の生体内への回収率や半減期（表1）、あるいは消費性凝固障害の有無などを考慮して投与量や観血的投与間隔を決定する。なお、個々の凝固因子欠乏症における治療的投与や観血的投与時の予

防的投与の場合、それぞれの凝固因子の安全な治療域レベルを観察して投与量や投与間隔を決定する。

表 1 痍因子の生物学における動態と止血レベル

因子	止血に必要な濃度 <sup>a)</sup>	生体半減期	生体内回収率	安定性(4°C保存)
フィブリノゲン プロトロンビン	75~100mg/dl 40%	3~6日 2~5日	50% 40~60%	安定 不安定 <sup>b)</sup>
第V因子 第VII因子	15~25%	15~36時間 2~7時間	89% 70~60%	安定 不安定 <sup>b)</sup>
第IX因子 第X因子	5~10%	8~12時間	80~80%	不安定 <sup>b)</sup>
第XI因子 第XII因子	10~40%	18~24時間	40~50%	不安定 <sup>b)</sup>
第XIII因子 第XIV因子	10~20%	1.5~2日	50%	安定
第XV因子 第XVI因子	15~30%	3~4日	90~100%	安定
第VII/VIII複合因子 第VII/VIII複合因子	1~3%	—	—	安定 不安定
第VII/VIII複合因子 第VII/VIII複合因子	25~50%	6~10日 3~5時間	5~100%	—

1) FAIBB Recommended Test  
2) 第VII因子に対する活性は50%以下  
3) FAIBB Recommended Test  
4) 第VII因子に対する活性は25%以下  
5) FAIBB Recommended Test  
6) 一括を表示

#### 4. 効果の評価

投与の妥当性、選択した投与量の的確性あるいは副作用の予防対策などに資するため、新鮮凍結血漿の投与前には、その必要性を明確に把握し、必要とされる投与量を算出する。投与後には投与前の検査データと臨床所見の改善の程度を比較して評価し、副作用の有無を観察して診療録に記載する。

#### 5. 不適切な使用

- 循環血漿量減少のある病態には、新鮮凍結血漿と比較して膠質浸透圧が高く、より安全な人工膠原液あるいは等張アルブミン製剤の適応である。
- たん白質源としての栄養補給  
輸血により補充された血漿たん白質（主成分はアルブミン）はアミノ酸にまで緩徐に分解され、その多くは熱源として消費されてしまい、患者のたん白質源とはならない。この目的のために、中心静脈栄養法や経腸栄養法が適応である（アルブミン製剤の適正使用：5-1）「たん白質源としての栄養補給」の項を参照。
- 創傷治癒の促進  
創傷の治癒に関与する血漿たん白質としては、急性反応期たん白質であるフィブリノゲン、第VIII因子、フィブリノゲン、プロトロンビン因子などが考えられている。

しかしながら、新鮮凍結血漿の投与により、これらを補給しても、創傷治癒が促進されるという医学的根拠はない。

#### 4) 末期患者への投与

末期患者に対しては、患者の自由意思を尊重し、単なる延命措置は控えるという考え方がある。輸血疾患といえども、その例外ではなく、患者の意思を尊重しない單なる時間的延命のための投与は控えるべきである。

#### 5) その他

重症感染症の治療、DIC を伴わない熱傷の治療、人工心肺使用時の出血予防、非代償性肝硬変での出血予防なども新鮮凍結血漿投与の適応とはならぬ。

#### 6. 使用上の注意点

- 使用法  
新鮮凍結血漿を使用する場合には、輸血セットを使用する。使用時には 30~37°C の恒温槽中で急速に融解し、速やか（3 時間以内）に使用する。なお、製剤ラベルの剥離を避けとともに、バッグ破損による細胞汚染を起さず可能性を考慮して、必ずビニール袋に入れる。融解後にやむを得ず保存する場合には、常温ではなく 2~6°C の保冷庫内に保管する。保存すると不安定な凝固因子（第V、 VIII因子）は急速に失活するが、その他の凝固因子の活性は比較的長い間保たれる（表 1）。

#### 2) 感染症の伝播

新鮮凍結血漿はアルブミンなどの血漿分画製剤とは異なり、ウイルスの不活化が行われていないため、血液を介する感染症の伝播を起こす危険性がある。輸血実施前にバッグ内の血液について色調の変化、凝血塊の有無、あるいはベッグの破损や開封による閉鎖系の破綻等の異常がないことを肉眼で確認する。

#### 3) クエン酸中毒（低カルシウム血症）

大量投与によりカルシウムイオンの低下による症状（手指のしづれ、嘔気など）を認めることがあります。必要な場合にはグルコン酸カルシウム等カルシウム含有製剤を輸血実施時脈とは異なる静脈からゆっくり静注する。

- 4) ナトリウムの負荷  
白血球を除去した全血採血由来製剤(新鮮凍結血漿-LR「日赤」)は血液保存液としてCPD液を用いている。容量は、従来製剤の約1.5倍(200mL採血由来(FFP-LR120))では約120mL、400mL採血由来(FPP-LR240)では約240mLであり、200mL採血由來の場合は約0.45g(19mEq)、400mL採血由來(FPP-LR240)では約0.9g(38mEq)のナトリウム(Na<sup>+</sup>)が負荷される。また、成分採血由来製剤(FPP-LR480)のナトリウム濃度はCPD液と全血採血由来製剤(FPP-LR480)は血液保存液としてACD-A液を用いている。容量は480mLであり、約1.6g(71mEq)のナトリウム(Na<sup>+</sup>)が負荷される。
- 5) 非溶血性副作用  
時に発熱反応、アレルギーあるいはアナフィラキシー反応を起こすことがある。
- 6) ABO血型不適合輸血  
ABO同型の新鮮凍結血漿が入手困難な場合には、ABO血液型不適合の新鮮凍結血漿を使用してもよい。この場合、新鮮凍結血漿中の抗A、抗B抗体によって溶血が起こる可能性があるため、留意が必要である。

【注】出血に対する輸血療法  
1. 止血機序  
生体の止血機構は、以下の4つの要素から成り立っており、それらが順次作動して止血が完了する。これらといずれかの異常ににより病的な出血が起ころる。輸血用血液による補充療法の対象となるのは血小板と凝固因子である。

#### a. 血管壁：収縮能

#### b. 血小板：血小板栓形成（一次止血）、すなわち血小板の粘着・凝集能

#### c. 凝固因子：凝固系の活性化、トロンビンの生成、次いで最終的なフィブリリン血栓形成（二次止血）

#### d. 濃溶因子：プラスミンによる血栓の溶解（纖維素溶解）能

#### 2. 基本的な考え方

- 新鮮凍結血漿の使用には治療的投与と予防的投与がある。血小板や凝固因子などの止血因子の不足に起因した出血傾向に対する治療的投与は、絶対的適応である。一方、出血の危険性は血小板数、出血時間、PT、APTT、フィブリノゲンなどの検査値からは必ずしも予測できない。止血機能検査値が異常であつたとしても、それが軽度であれば、たとえ凝血文獻

- 1) 藤村吉博：VWF 切断酵素 (ADAMTS13) の動態解析による TTP/HUS 診断法の進歩. 日本内科学会雑誌 2004; 93 : 451-459
- 2) Mori Y, et al: Predicting response to plasma exchange in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura with measurement of VWF-cleaving protease activity. Transfusion 2002;42:572-580
- 3) AABB:Blood Transfusion Therapy;A Physician's Handbook (7th ed.), 2002,p.27

## V アルブミン製剤の適正使用

### 1. 目的

アルブミン製剤を投与する目的は、血漿膠質浸透圧を維持することにより循環血漿量を確保すること、及び体腔内液や組織間液を血管内に移行させることによって治療抵抗性の重度の浮腫を治療することにある。

なお、アルブミンの製法と性状については参考 18 を参照。

2. 使用指針

急性の低たん白血症に基づく病態、また他の治療法では管理が困難な慢性的低たん白血症による病態に対して、アルブミンを補充することにより一時的な病態の改善を図るために使用する。つまり膠質浸透圧の改善、循環血漿量の是正が主な適応であり、通常前者には高張アルブミン製剤、後者には等張アルブミン製剤あるいは加熱人血漿たん白を用いる。

なお、本使用指針において特に規定しない場合は、等張アルブミン製剤には加熱人血漿たん白を含むこととする。

#### 2. 使用指針

##### 1) 出血性ショック等

出血性ショックに陥った場合には、循環血漿量の 30%以上が喪失したと考えられる。このように 30%以上の出血をみる場合には、初期治療としては、細胞外液補充液（乳酸リソグリル液、蓄酸リソグリル液など）の投与が第一選択となり、人工膠質液の併用も推奨されるが、原則としてアルブミン製剤の投与は必要としない。循環血漿量の 50%以上の多量の出血が疑われる場合や血清アルブミン濃度が 3.0g/dL 未満の場合には、等張アルブミン製剤の併用を考慮する。循環血漿量の補充量は、ペタルクサン、尿量、中心静脈圧や肺動脈楔入圧、血清アルブミン濃度、さらには可能であれば膠質浸透圧を参考にして判断する。もし、腎機能障害などで人工膠質液の使用が不適切と考えられる場合には、等張アルブミン製剤を使用する。また、人工膠質液を 1,000mL 以上必要とする場合にも、等張アルブミン製剤の使用を考慮する。

なお、出血により不足したその他の血液成分の補充については、各成分製剤の使用指針により対処する（特に「術中の輸血」の項を参照；図 1）。

##### 2) 人工心肺を使用する心臓手術

通常、心臓手術時の人工心肺の充填には、主として細胞外液補充液が使用される。なお、人工心肺実施中の血漿希釈で起こった低アルブミン血症は、血清アルブミンの喪失による

ものではなく一時的なものであり、利尿により術後数時間で回復するため、アルブミン製剤を投与して補正する必要はない。ただし、術前より血清アルブミン (Alb) 濃度又は膠質浸透圧の高度な低下のある場合、あるいは体重 10kg 未満の小児の場合などには等張アルブミン製剤が用いられることがある。

### 3) 肝硬変に伴う難治性腹水に対する治療

肝硬変などの慢性的病態による低アルブミン血症は、それ自体ではアルブミン製剤の適応とはならない。肝硬変ではアルブミンの生成が低下しているものの、生体内半減期は代償的に延長している。たとえアルブミンを投与しても、かえってアルブミンの合成が抑制され、分解が促進される。大量 (4L 以上) の腹水穿刺時に循環血漿量を維持するため、高張アルブミン製剤の投与が、考慮される\*。また、治療抵抗性の腹水の治療に、短期的 (1 週間を限度とする) に高張アルブミン製剤を併用することがある。

\*Runyon BA:Management of adult patients with ascites due to cirrhosis. Hepatology 2004;39:841-856

### 4) 難治性の浮腫、肺水腫を伴うネフローゼ症候群

ネフローゼ症候群などの慢性的病態は、通常アルブミン製剤の適応とはならない。むしろ、アルブミンを投与することによってステロイドなどの治療に抵抗性となることが知られている。ただし、急性かつ重症の末梢性浮腫あるいは肺水腫に対しては、利尿薬に加えて短期的 (1 週間を限度とする) に高張アルブミン製剤の投与を必要とする場合がある。

### 5) 循環動態が不安定な血液透析等の体外循環施行時

血液透析時に血压の安定が悪い場合には、特に糖尿病を合併している場合や術後などアルブミン血症のある場合には、透析に際し低血压やショックを起こすことがあるため、循環血漿量を増加させる目的で予防的投与を行うことがある。ただし通常は、適切な体外循環の方法の選択と、他の薬物療法で対処することを基本とする。

### 6) 衝撃因子の補充を必要としない治療的血漿交換療法

治療的血漿交換療法には、現在様々の方法がある。有害物質が同定されていて、選択的若しくは選択性的有害物質除去の方法が確立されている場合には、その方法を優先する。それ以外の非選択性有害物質除去や、有用物質補充の方法として、血漿交換療法がある。ギランバレー症候群、急性重症筋無力症など凝固因子の補充を必要としない症例では、

置換液として等張アルブミン製剤を使用する。アルブミン製剤の使用は、肝炎発症などの輸血副作用の危険がほとんどなく、新鮮凍結血漿を使用することと比較してより安全である。

膠質浸透圧を保つためには、通常は、等張アルブミン若しくは高張アルブミンを電解質液に希釈して置換液として用いる。血中アルブミン濃度が低い場合には、等張アルブミンによる置換は、尿水腫等を生じる可能性があるので、置換液のアルブミン濃度を調節する等の注意が必要である。加熱入血漿たん白は、まれに血圧低下をきたすので、原則として使用しない。やむを得ず使用する場合は、特に血圧の変動に留意する。1回の交換量は、循環血漿量の等張なしし1.6倍量を基準とする。開始時は、置換液として人工膠質液を用することも可能な場合が多い（血漿交換の置換液として新鮮凍結血漿が用いられる場合には、新鮮凍結血漿の項参照）。また、治療的血漿交換療法に関する留意事項については、参考14を参照）。

#### 7) 重症熱傷

熱傷後、通常18時間以内は原則として細胞外液補充液で対応するが、18時間以内であっても血清アルブミン濃度が1.5g/dL未満の時は適応を考慮する。  
熱傷部位が体表面積の50%以上あり、細胞外液補充液では循環血漿量の不足を是正する二ことが困難な場合には、人工膠質液あるいは等張アルブミン製剤で対応する。

8) 低たん白血症に起因する肺水腫あるいは著明な浮腫が認められる場合  
術前、術後あるいは経口摂取不能な重症の下痢などによる低たん白血症が存在し、治療抵抗性の肺水腫あるいは著明な浮腫が認められる場合には、利尿薬とともに高張アルブミン製剤の投与を考慮する。

9) 循環血漿量の著明な減少を伴う急性肺炎など  
急性肺炎、腸閉塞などで循環血漿量の著明な減少を伴うショックを起こした場合には、等張アルブミン製剤を使用する。

#### 3. 投与量

投与量の算定には下記の計算式を用いる。このようにして得られたアルブミン量を患者の病状に応じて、通常2~3日で分割投与する。

$$\text{必要投与量 (g)} = \text{期待上昇濃度 (g/dL)} \times \text{循環血漿量 (dL)} \times 2.5$$

ただし、期待上昇濃度は期待値と実測値の差、循環血漿量は0.4dL/kg、投与アルブミンの血管内回収率は4/10(40%)とする。

たとえば、体重1kgの患者の血清アルブミン濃度を0.6g/dL上昇させたいときには、  
 $0.6g/dL \times (0.4dL/kg \times 1kg) \times 2.5 = 0.6 \times 2.5 = 1.6g$ を投与する。  
すなわち、必要投与量は期待上昇濃度 (g/dL) × 体重 (kg)により算出される。  
一方、アルブミン1gの投与による血清アルブミン濃度の上昇は、体重1kgの場合には、「アルブミン1g×血管内回収率(4/10)」(g) / 「循環血漿量」(dL)すなわち、  
 $[1g \times 0.4 / (0.4dL/kg \times 1kg)] = 1/4 (g/dL)$ つまり体重の逆数で表わされる。

#### 4. 投与効果の評価

アルブミン製剤の投与前には、その必要性を明確に把握し、必要とされる投与量を算出する。投与後には投与前後の血清アルブミン濃度と臨床所見の改善の程度を比較して効果の判定を行い、診察録に記載する。投与後の目標血清アルブミン濃度としては急性の場合3.0g/dL以上、慢性的の場合は2.5g/dL以上とする。  
投与効果の評価を3日間を目途に行い、使用的維続を判断し、漫然と投与し続けることのないように注意する。

なお、膠質浸透圧の計算式については本項末尾【注】「膠質浸透圧について」に記載している。

#### 5. 不適切な使用

1) たん白質源としての栄養補給  
投与されたアルブミンは体内で緩徐に代謝（半減期は約17日）され、そのほとんどは熱源として消費されてしまう。アルブミンがアミノ酸に分解され、肝臓におけるたん白質の再生産の原料となるのはわずかで、利用率が極めて低いことや、必須アミノ酸であるトリプトファン、イソロイシン及びメチオニンが極めて少ないとことから、栄養補給の意義はほとんどない。手術後の低たん白血症や悪性腫瘍に使用しても、一時的に血漿たん白濃度を上昇させて膠質浸透圧効果を示す以外に、栄養学的な意義はほとんどない。栄養補給の目的には、中心静脈栄養法、経腸栄養法によるアミノ酸の投与とエネルギーの補給が栄養学的にたん白質の生成に有効であることが定説となっている。

- 2) 脳虚血  
脳虚血発作あるいはクモ膜下出血後の血管収縮に対する人工膠質液あるいはアルブミン製剤の投与により、脳組織の障害が防止されるという医学的根拠はなく、使用的対象とはならない。
- 3) 単なる血清アルブミン濃度の維持  
血清アルブミン濃度が2.5～3.0g/dLでは、末梢の浮腫などの臨床症状を呈さない場合も多く、血清アルブミン濃度の維持や検査値の是正のみを目的とした投与は行うべきではない。
- 4) 末期患者への投与  
末期患者に対するアルブミン製剤の投与による延命効果は明らかにされていない。
- 生命尊厳の観点からも不必要な投与は控えるべきである。
- ## 6. 使用上の注意点
- ナトリウム含有量  
各製剤中のナトリウム含有量〔3.7mg/mL (160mEq/L) 以下〕は同等であるが、等張アルブミン製剤の大容量使用はナトリウムの過大な負荷を招くことがあるので注意が必要である。
  - 肺水腫、心不全  
高張アルブミン製剤の使用時には急激に循環血漿量が増加するので、輸注速度を調節し、肺水腫、心不全などの発生に注意する。なお、20%アルブミン製剤50mL (アルブミン10g) の輸注は約200mLの循環血漿量の増加に相当する。
  - 血圧低下  
加圧人血清たん白の急速輸注 (10mL/分以上) により、血圧の急激な低下を招くことがあるので注意する。
  - 利尿  
利尿を目的とするときには、高張アルブミン製剤とともに利尿薬を併用する。
  - アルブミン合成能の低下  
慢性の病態に対する使用では、アルブミンの合成能の低下を招くことがある。特に血清

アルブミン濃度が4g/dL以上では合成能が抑制される。

〔注〕 腹質浸透圧について  
腹質浸透圧 ( $\pi$ ) は、pH、温度、構成するたん白質の種類により影響されるため、実測値の方が信頼できるが、血清中のたん白濃度より算定する方法もある。血清アルブミン濃度、給血清たん白 (TP) 濃度からの算出には下記の計算式を用いる。

1. 血清アルブミン値 (g/dL) よりの計算式：

$$\pi = 2.8G + 0.16C^2 + 0.012C^3$$

2. 総血清たん白濃度 (g/dL) よりの計算式：

$$\pi = 2.1C + 0.16C^2 + 0.009C^3$$

計算例：

1. アルブミン投与により Alb 値が 0.5g/dL 上昇した場合の腹質浸透圧の上昇 (1式より)。

$$\pi = 2.8 \times 0.5 + 0.18 \times 0.5^2 + 0.012 \times 0.5^3$$

2. TP 値が 7.2g/dL の場合の腹質浸透圧 (2式より)。

$$\pi = 2.1 \times 7.2 + 0.16 \times 7.2^2 + 0.009 \times 7.2^3$$

$$= 26.77 \text{ mmHg}$$

## VI 新生児・小児に対する輸血療法

小児、特に新生児に血液製剤を投与する際に、成人の血液製剤の使用指針を適用するこには問題があり、小児に特有な生理機能を考慮した指針を策定する必要がある。しかししながら、小児一般に対する血液製剤の投与基準については、いまだ十分なコンセンサスが得られているとは言い難い状況にあることから、未熟児についての早産貧血への赤血球液の投与方法、新生児への血小板濃厚液の投与方法及び新生児への新鮮凍結血漿の投与方法に限定して指針を策定することとした。

### 1. 未熟児早期貧血に対する赤血球液の適正使用<sup>1)</sup>

未熟児早期貧血の主たる原因是、骨髓造血機構の未熟性であり、生後1～2ヶ月頃に認められる新生児の貧血が生理的範囲を超えたものともいえる。出生時の体重が少ないので早く、かつ強く現われる。飼剤には反応しない。エリスロボエチンの投与により改善できる症例もある。しかしながら、出生体重が著しく少ない場合、高度の貧血を求めて赤血球輸

血が必要となることが多い。  
なお、ここでの輸血の対象兒は、出生後 28 日以降 4か月までであり、赤血球液の輸血は以下の指針に準拠するが、未熟兒は多様な病態を示すため個々の症例に応じた配慮が必要である。

#### 1) 使用指針

##### (1) 呼吸障害が認められない未熟兒

- i. Hb 値が 9g/dL 未満の場合  
通常、輸血の適応となるが、臨床症状によつては必ずしも輸血の必要はない。  
ii. Hb 値が 8~10g/dL の場合  
貧血によると考えられる次の臨床症状が認められる場合には、輸血の適応となる。  
持続性の頻脈、持続性の多呼吸、無呼吸、周期性呼吸、不活発、哺乳時の易疲労、体重増加不良、その他

##### (2) 呼吸障害を合併している未熟兒

障害の程度に応じて別途考慮する。

#### 2) 授与方法

##### (1) 使用血液

##### (2) 授与の量と速度

- i. うつ血性心不全が認められない未熟兒  
1回の輸血量は 10~20mL/kg とし、1~2mL/kg/時間 の速度で輸血する。ただし、輸血速度についてはこじり外の速度 ( $2mL/kg/\text{時間以上}$ ) での検討は十分に行われていない。  
ii. うつ血性心不全が認められる未熟兒  
心不全の程度に応じて別途考慮する。

#### 3) 使用上の注意

##### (1) 溶血の防止

新生児に対する採血後 2週間未満の赤血球液の安全性は確立されていて、2週間以降の赤血球液を放射線照射後に白血球除去フィルターを通してから 24G より細い注射針を用いて輸注ポンプで加圧して輸血すると、溶血を起こす危険性があるので、新生児の輸血に際しては、輸血速度を速くし、溶血の出現に十分な注意を払う必要がある。  
なお、日本赤十字社から供給される赤血球後 (赤血球後-LR 「日赤」) 及び照射赤血球後-LR

「日赤」) は、保存前白血球除去の導入により、ベッドサイドでの白血球除去フィルターを使用する必要はなくなった。

##### (2) 長時間要する輸血

血液バッグ開封後は 6 時間以内に輸血を完了する。残余分は破棄する。1回量の血液を輸血するのに 6 時間以上を要する場合には、使用血液を無菌的に分割して輸血し、未使用の分割分は使用時まで 2~6°C に保存する。

##### (3) 院内採血

院内採血は医学的に適応があり、「輸血療法の実施に関する指針」の X-II の 2 の「必要となる場合」に限り行うべきであるが、実施する場合は、採血基準 (安全な血液製剤の安定供給の確保等に關する法律施行規則 (昭和 31 年厚生省令第 22 号) 別表第二) に従うこととする。また、放射線照射血液製剤において致死的な合併症である輸血後移植片対宿主病が報告されていることから、原則として 15~50 Gy の範囲での放射線照射をする必要がある。さらに感染性の副作用が起ることにも留意する必要がある。

## 2. 新生児への血小板濃厚液の適正使用

#### 1) 使用指針

- (1) 局所性の紫斑のみないしは、出血症状がみられず、全身状態が良好な場合は、血小板数が 3 万/ $\mu\text{L}$  未満のときに血小板濃厚液の投与を考慮する。  
(2) 広汎な紫斑ないしは紫斑以外にも明らかな出血 (鼻出血、口腔内出血、消化管出血、頭蓋内出血など) を認める場合には、血小板数を 5 万/ $\mu\text{L}$  以上に維持する。  
(3) 肝臓の未熟性などにより凝固因子の著しい低下を伴う場合には、血小板数を 5 万/ $\mu\text{L}$  以上に維持する。  
(4) 侵襲的処置を行う場合には、血小板数を 5 万/ $\mu\text{L}$  以上に維持する。

## 3. 新生児への新鮮凍結血漿の適正使用

#### 1) 使用指針

- (1) 凝固因子の補充  
ビタミン K の投与にもかかわらず、PT 及び/又は APT の著明な延長があり、出血症状を認めるか侵襲的処置を行う場合  
(2) 血循血液量の 1/2 を超える赤血球液輸血時  
(3) Upshaw-Schulman 症候群 (先天性血栓性血小板減少性紫斑病)

- 2) 投与方法  
(1) と (2) に対しては、10~20ml/kg 以上を必要に応じて 12~24 時間毎に繰り返し投与する。

(3) に関しては 10ml/kg 以上を 2~3 週間毎に繰り返し投与する。

- 3) その他  
新生児多血症に対する部分交換輸血には、從来、新鮮凍結血漿が使用されてきたが、ほとんどの場合は生理食塩水で代替可能である。

#### 文献

1) 日本小児科学新生児委員会報告：未熟児早期食血に対する輸血ガイドラインについて。

日兒誌 1995;99:1529-1530

おわりに  
輸血医学を含む医学の各領域における進歩発展は目覚しく、最新の知見に基づき本指針の見直しを行った。本指針ができるだけ早急に、かつ広範に浸透するよう、関係各位の御協力をお願いしたい。今後は、特に新たな実証的な知見が得られた場合には、本指針を速やかに改正していく予定である。

#### 参考 1 慢性食血（造血幹細胞移植）

##### 1) 赤血球輸血

###### 基本的な適応基準

造血幹細胞移植後の造血回復は前処置の強度によって異なる。造血機能を高度に低下させる前処置を用いる場合は、通常、造血が回復するまで移植後 2~3 週間を要する。この間、ヘモグロビン (Hb) の低下を認めるために赤血球輸血が必要になる。この場合、通常の慢性貧血と同様に Hb 値の目安として 7g/dL を維持するように、赤血球液 (RBC) を輸血する。発熱、うつ血性心不全、あるいは代謝の亢進の場合は安静にしていれば、それより低い Hb 値にも耐えられるので、臨床症状や合併症を考慮し RBC の適応を決定する。

###### 白血球除去赤血球液

輸血用血液中の間種白血球により、発熱反応、同種抗体産生、サイトメガロウイルス (cytomegalovirus; CMV) 感染などの有害事象が生じるので、それらの予防のために原則的に白血球除去赤血球を用いる。特に患者が抗 CMV 抗体陰性の場合でも、白血球除去輸血により抗 CMV 抗体陰性の献血者からの輸血とほぼ同等による CMV 感染を予防できる。最近の抗体陰性血と白血球除去血の輸血による感染の比較検討では、感染予防率はいずれの場合も 90% 以上であるが、抗体陰性血の方が高いことが報告されている。<sup>1)</sup> なお、日本赤十字社から供給される赤血球液（赤血球液-LR「日赤」及び照射赤血球液-LR「日赤」）は、白血球数が 1 パックあたり  $1 \times 10^9$  以下であるように調製されている。

##### 2) 血小板輸血

###### 基本的な適応基準

###### 出血予防

造血機能を高度に低下させる前処置を用いた造血幹細胞移植後は、患者血小板数が減少するので、出血予防のために血小板濃厚液 (PC) の輸血が必要になる。血小板濃厚液の適応は血小板数と臨床症状を参考にする。通常、出血予防のためには血小板数が 1~2 万/ $\mu$ l 以下の場合が血小板濃厚液の適応になる。ただし、感染症、発熱、播種性血管内凝固などとの合併症がある場合は出血傾向が増強するので注意する。血小板数を測定し、その結果で当日の血小板濃厚液の適応を決定し輸血することが望まれる。ただし、連日の採血による患者への負担を考慮し、また、定期的な造血幹細胞移植では血小板が減少する期間を予測できるので、週単位での血小板濃厚液輸血を計画できる場合が多い。この場合は、1 週間に 2~3 回の頻度で 1 回の輸血量としては経験的に 10 単位が使用されているが、さらに少量の投与でもよい可能性がある。

体がある場合である。

移植後、患者の血液型は造血の回復に伴いドナー血液型に変化していくので、特にABO血液型で患者とドナーで異なる場合には、輸血用血液製剤の適切な血液型を選択する必要がある。以下に血液型選択のための基準を示す。

1. 血液型一致  
赤血球、血小板、血漿ともに原則的に患者血液型と同型の血液型を選択する。
  2. 主不適合 (major mismatch)  
患者の抗体によってドナー由来の赤血球造血が遅延する危険性があるので、これを予防するために血小板、血漿はドナー血液型抗原に対する抗体がない血液型を選択する。赤血球は患者の抗体に反応しない血液型を選択する。
  3. 副不適合 (minor mismatch)  
ドナーインペリアルが移植後、患者血液型に対する抗体を産生し、患者赤血球と反応する可能性があるので、赤血球はドナーの抗体と反応しない血液型を選択する。血小板と血漿は患者赤血球と反応する抗体がない血液型を選択する。
  4. 主副不適合 (major and minor mismatch)  
ABO血液型主副不適合の場合は、血小板、血漿がAB型、赤血球はO型になる。さらに、移植後ドナーの血液型に対する抗体が検出できなくなればドナーの血液型の赤血球を、患者の血液型の赤血球が検出できなければドナーの血液型の血小板濃厚液、新鮮凍結血漿を輸血する。  
Rho (D) 抗原が患者とドナーで異なる場合には、抗 Rho (D) 抗体の有無によって異なるが、患者が Rho (D) 抗原陰性の場合には抗 Rho (D) 抗体があるものとして、あるいは產生される可能性があるものとして考慮する。また、ドナーが Rho (D) 抗原陰性の場合にも抗 Rho (D) 抗体があるものとして考慮する。
  - 5) 免疫グロブリン  
通常の免疫グロブリンの適応と同様である。
  - 6) 輸血用血液製剤の血液型の選択
- 通常のアルブミン製剤の適応と同様である。
- 通常の免疫グロブリンの適応と同様、抗生物質や抗ウイルス剤の治療を行っても効果が乏しい感染症に対し適応になり、抗生物質併用し用いる。
- 同種造血幹細胞移植において、患者血液型と造血幹細胞提供者（ドナー）の血液型が同じ場合と異なる場合がある。これは1. 血液型一致 (match), 2. 主不適合 (major mismatch), 3. 副不適合 (minor mismatch), 4. 主副不適合 (major and minor mismatch), に分類される。1は患者血液型とドナーの血液型が同一である場合、2は患者にドナーの血液型抗原に対する抗体がある場合、3はドナーに患者の血液型抗原に対する抗体がある場合、4は患者にドナーの血液型抗原に対する抗体があり、かつドナーに患者の血液型抗原に対する抗

表1 血液型不適合造血幹細胞移植直後の輸血療法

血液型	不適合	血液型		輸血	
		R+/-	患者	赤血球	血小板、血漿
ABO 血液型	主不適合	A	0	0	A(もししなければOK)
		B	0	0	B(もししなければOK)
		AB	0	0	AB
	副不適合	AB	A(もししなければOK)	AB	
		AB	B(もししなければOK)	AB	
		0	A	0	A(もししなければOK)
		0	B	0	B(もししなければOK)
		AB	0	0	AB
	主副不適合	A	AB	A(もししなければOK)	
		AB	B(もししなければOK)	AB	
		0	B	0	AB
		AB	0	0	AB
		AB	A(もししなければOK)	AB	
		AB	B(もししなければOK)	AB	
		0	A	0	AB
		0	B	0	AB
		AB	A	0	AB
		AB	B	0	AB
Rh(+) 抗原	主不適合	D+	D-	D-	D+
	副不適合	D-	D+	D-	D+

移植前から造血幹細胞までの輸血における製剤別の選択血液型を示す。

## 参考2 一般外科手術

術前の食血、術中及び術後出血量や患者の病態に応じて、SBOEなどに従い術前輸血準備を行なう。術前自己血貯血が可能な患者では、術前貯血を行うことが推奨される。しかし、自己血の過剰な貯血は患者のみならず、輸血部の負担となり、自己血の貯蔵にもつながる。予想出血量に応じた貯血を行う必要がある。

重篤な心肺疾患や中枢神経系疾患がない患者において、輸血を開始するHb値（輸血トリガーチート）が7~8g/dLとする。循環血液量の20%以内の出血量でありHb値がトリガーチート以上に保たれている場合には、乳酸リンゲル液や酢酸リソングル液、生理食塩液などの細胞外液補充液により循環血液量を保つようになる。細胞外液補充液は出血量の3~4倍を血圧、心拍数などのペイタルサインや、尿量、中心静脈圧などを参考に投与する。出血量が循環血液量の10%ある時は500mLを超えるようの場合には、ヒドロキシエチルデンプンなどの人工膠質液を投与してもよい。ただし、ヒドロキシエチルデンプンは大量投与により血小

板凝集抑制を起こす可能性があるので、投与量は20mL/kgあるいは1000mL以内に留める。循環血液量の50%以上の多量の出血が疑われる場合や血清アルブミン濃度が3.0g/dL未満の場合は、等張アルブミン製剤の併用を考慮する。赤血球輸血を行う前に採血を行い、Hb値やHt値などを測定するとともに、輸血後はその効果を確認するために再び採血を行いHb値やHt値の上昇を確認する必要がある。

## 参考3 心臓血管外科手術

輸血量における施設間差

心臓血管外科手術における輸血使用量は施設間差が大きい。これは外科手技の差によるもののか、輸血に対する考え方の差によるところが大きい。それは、少ない輸血量でも、患者の予後に影響することなく心臓血管外科手術が行えている施設があることから示唆される。人工心肺を用いないoff-pump冠動脈バイパス術においては、一般に出血量も少なく、術中に自己血回収を行う場合が多いため、輸血量も少ない。しかし、人工心肺を用いたり、超低体温循環停止を要するような大血管手術における輸血量となると施設間差が大きくなる。これは、凝固因子不足や血小板数不足、血小板機能異常などによる出血傾向に対しても治療が行われるのでなく、単なる血小板数の正常以下への減少、人工心肺を使用することでによる血小板機能や凝固因子減少が起ることといった検査値、あるいは理論的問題に対しても輸血が行われる場合がしばしばあるからであろうと考えられる。そのためには、外科的な出血の処置に先立って、凝固因子や血小板補充が行われている場合もしばしばはある。

人工心肺使用時に血被希釈が起こる。人工心肺中の出血についての上限及び下限は明らかでない。人工心肺中の出血が7~8g/dL以上(<10g/dL)になるようになると、人工心肺使用時に血被希釈後はHb値が7~8g/dL以上(10g/dL)になるようになることが多い。

18~26°Cの低体温により血小板数は減少する。主として門脈系に血小板が捕捉sequestrationされることによる。80%以上の血小板は復温とともに循環血液中に戻る。<sup>3)</sup>したがって、低体温時の血小板数減少の解釈には注意を要する。また、低体温によりトロンボサン合成酵素阻害によるトロンボキサンA2産生低下が起こり、血小板凝集能は大きく低下するほか、<sup>4,5)</sup>、血管内皮細胞障害も起ころ。復温により血小板凝集能は完全な回復には時間がかかる。最近よく用いられる常温人工心肺では血小板凝集能低下はない<sup>6)</sup>。

人工心肺を用いた手術において、検査所見に基づいた輸血を行うことで、経験的な方法に比べ出血量を増加させることなく、新鮮凍結血漿や血小板濃厚液などの輸血量を減少させることが出来たと報告されている<sup>7)</sup>。

止血のためにには血小板数が5~10万/ $\mu\text{L}$ 、凝固因子が正常の20~40%あれば十分である

ことをよく認識する必要がある。血小板輸血や新鮮凍結血漿を投与する場合、正常あるいはそれを上回るような補充は不要であることをよく認識すべきである。

術前の薬物療法が有効な食血の是正

心臓手術において、術前の食血は同種血輸血を必要とする重要な因子である。腎不全や、鉄欠乏性貧血もしばしばみられる<sup>8)</sup>。また、術前に冠動脈造影を受けた患者では貧血になりやすいので注意が必要である。また、鉄欠乏性貧血も存在するので、鉄剤などによる治療が必要なことがある。

#### 血小板濃厚液や新鮮凍結血漿の予防的投与の否定

人工心肺症例における血小板濃厚液や新鮮凍結血漿の予防的投与は勧められない。

#### 出血量に關係する因子

乳児心臓血管外科手術においては、低体温人工心肺中の核心温度が出血量と關係すると報告されている。1歳以上の小児心臓血管外科手術では、再手術、術前から的心不全、長時間にわたる人工心肺時間が出血量と同種血輸血量の多さと関係している<sup>9)</sup>。

同種血輸血量の減少には、術中の凝固検査のチェックを行い、不足した成分を補充する方法が有用である。複雑な心臓手術においては、トロンボエラストグラム (TEG) 等が参考になるとの報告がある<sup>10)</sup>。

#### 参考 4 肺外科手術

肺切除術の多くは胸腔鏡下に行われるようになつた。肺外科手術においては一般に出血量や体液シフトも比較的少ない。肺切除術や肺全摘術においても、Hb 値は 8.5~10 g/dL でよいと考えられる<sup>11)</sup>。

#### 参考 5 食道手術

食道全摘術及び胃腸管を用いた食道再建術では、しばしば出血量も多くなるほか、体液のサードスペースへの移行など大きな体液シフトが起ころ。輸血準備量は、患者の病態、体格、術前 Hb 値、術中及び術後出血量などを考慮して決定する。

術前の栄養状態が良好で、貧血もない患者では自己血貯血も考慮する。同種血輸血を用いず自己血輸血のみで管理した症例では、癌の再発率が低下し、再発後の生存期間も長くなるという後ろ向き研究による報告がある<sup>12)</sup>。自己血輸血を行った方が免疫機能が保たれ、術後感染もしにくいという報告もある<sup>13, 14)</sup>。輸血が必要であった患者では、輸血をしなかつた

患者に比べて予後が不良であったという報告もある<sup>15)</sup>。

食道癌患者はしばしば高齢であるが、全身状態が良好な患者における輸血を開始する Hb 値(輸血トリガーベース)は、Hb 値 7~8 g/dL とする。冠動脈疾患などの心疾患があり循環不備力が減少した患者や、慢性閉塞性肺疾患などの肺疾患により術後の血液酸素化悪化が予想される患者、骨髄における血球産生能が低下している患者では、輸血トリガーベースはより高いものとするのが妥当である。ただし、10 g/dL より高く設定する必要はない。

#### 参考 6 整形外科手術

膝関節全置換術や股関節全置換術において、等容積性の希釈式自己血輸血、術中回収式自己血輸血、さらには体温の問題特ににより同種血輸血量を減少させることができることが示唆されている<sup>16)</sup>。過剰輸血に注意が必要である<sup>17)</sup>。

膝関節全置換術においては、術中はターニケットを使用するために、術中出血は比較的小ないが術後出血量も多い。術中に等容積性の希釈式自己血輸血により自己血を採取し、術後に返血したり<sup>18)</sup>、術後ドレーン血を反血するという自己血輸血によっても同種血輸血量を減少させることができる<sup>19)</sup>。

脊椎外科手術においてはしばしば出血量が多くなり、赤血球液のほか、血小板濃厚液や新鮮凍結血漿などが必要になる場合がある。適宜、プロトロンビン時間、INR、部分トロンボプラスチン時間の測定を行い、使用指針に従って実施する<sup>20)</sup>。

低体温による血小板機能障害や凝固系抑制が起こるが、軽度低体温でも股関節全置換術では出血量が増加すると報告されている<sup>21)</sup>。外科的止血に加え、低体温のような出血量を増加させる要因についても注意が必要である。

#### 参考 7 腦神経外科手術

脳神経外科手術は、頭蓋内病変の治療上、それらの病変による頭蓋内圧上昇などにより起ころる二次的な損傷を防ぐことにある。したがって、脳神経外科手術においては、まず循環血流量を正常に保ち平均血圧及び脳灌流压を十分に保つことが重要である。しかし、脳神経外科手術においては、循環血流量評価がしばしば困難である。脳脊髄液や筋野手術、脳挫傷や硬膜外血腫、脳外傷手術など多岐にわたる。また、整形外科との境界領域であるが、脊髄手術も含まれる。

脳神経外科手術の基本は、頭蓋内病変による頭蓋内圧上昇などにより起ころる二次的な損傷を防ぐことにある。したがって、脳神経外科手術においては、まず循環血流量を正常に保ち平均血圧及び脳灌流压を十分に保つことが重要である。しかし、脳神経外科手術においては、循環血流量評価がしばしば困難である。脳脊髄液や筋野手術、脳挫傷や硬膜外血腫、脳外傷手術など多岐にわたる。また、整形外科との境界領域であるが、脊髄手術も含まれる。

脳神経外科手術においては、循環血流量評価がしばしば困難である。脳脊髄液や筋野手術、脳挫傷や硬膜外血腫、脳外傷手術など多岐にわたる。また、整形外科との境界領域であるが、脊髄手術も含まれる。

めに、血清浸透圧減少を防ぐことが重要である。正常血清浸透圧は 295m Osm/L であるのに対し、乳酸リンゴル酸や酢酸リソダル酸などはやや低張液である。生理食塩水は 308m Osm/L と高張であるが、大量投与により高塩素性代謝性アシドーシスを起こすので注意が必要である。

胸浮腫を防ぐために膠質浸透圧が重要であるとしばしば信じられているが、それを示す科学的証拠は乏しい。ほとんどの開頭手術では膠質液の投与は不要である。しかし、脳外傷や腹膜破裂、脳血管損傷などにより出血量が多くなった場合（たとえば循環血液量の 50%以上）には、ヒドロキシエチルデンパンなどの人工膠液や、アルブミン溶液投与が必要となる。ただし、ヒドロキシエチルデンパン大量投与では凝固因子希釈に加え、血小板凝集抑制、凝固第Ⅸ因子複合体への作用により出血傾向を起こす可能性がある。

#### 参考 8 泌尿器科手術

根治的前立腺切除術においては、術前の貯血式自己血輸血あるいは、術中の等容積性の希釈式自己血輸血により同種血輸血の投与量を減少させることができる。<sup>23)</sup>しかし、メタ分析では、希釈式自己血輸血による同種血輸血の減少については、疑問がもたれている。<sup>24)</sup>

根治的前立腺切除術において、術中の心筋虚血率は、術後頻脈や BT 値が 28%未満では多かったという報告がある。<sup>24)</sup>

#### 参考 9 大量出血や急速出術に対する対処

大量出血は循環血液量よりも 24 時間以内における出血量が多い場合をいう。しかし、外科手術の場合、特に外傷に対する手術では、数時間という短時間の間に循環血液量を超えるような出血や、急速に循環血液量の 1/3～1/2 を超えるような出血が起こる場合がある。

輸血準備の時間的余裕がある場合には、交差適合試験と放射線照射を行った赤血球袋を投与する。また、大量輸血時の適合血の選択については、「輸血療法の実施に関する指針」の V の 3 を参照。

急速大量輸血では代謝性アシドーシスや高カリウム血症が起こる可能性がある。高カリウム血症は、輸血速度が 1.2ml/kg/min を超えた場合に起こる。<sup>25)</sup>現在、輸血ポンプや加压バッグを備えた血液加温装置などの技術的進歩により輸血速度の輸血が可能になり、心停止を招くような高度の高カリウム血症が起こる可能性がある。<sup>26, 27)</sup>循環不全などによる代謝性アシドーシスも高カリウム血症を増悪させる要因となる。

大量出血患者では体温になりやすいが、特に輸液袋や輸血用血液製剤の加温が不十分な場合にはさらに体温となりやすい。低体温は術後のシバリングとともにによる酸素消費量の重大な増加を起こすだけでなく、感染症の増加などを起こすことが示唆されている。

急速・大量輸血を行う場合には、対流式輸液・輸血加温器など効率のよい加温器を使用する必要がある。その他、温風対流式加温ブランケットなどの使用により低体温を防ぐよう努めるべきである。

赤血球液や新鮮凍結血漿にはクエン酸が含まれているため、急速輸血により一時的に低カルシウム血症が起こる可能性がある。<sup>28)</sup>しかし、低カルシウム血症は一時的なものであり、臨床的に重大な影響を持つことは少ない。大量輸血時に血圧低下、心収縮性減少がある場合や、イオン化カルシウム濃度測定により低カルシウム血症が明らかな場合には、塩化カルシウムやグルコン酸カルシウムなどによりカルシウム補充を行う。

循環血液量以上の出血が起きた場合、新鮮凍結血漿により凝固因子を補つたり、血小板輸血により血小板を補う必要性は増加する。<sup>29)</sup>循環血液量以上の出血が起きても、新鮮凍結血漿を出血傾向予防のために投与することの有用性は否定されている。<sup>30)</sup>血小板輸血にあたっては、血小板回収率から考えて ABO 適合血小板濃厚液を用いることが望ましい。ABO 不適合血小板濃厚液も使用は可能であるが、血小板回収率は ABO 適合血小板濃厚液に比べ低くなることに注意が必要である。

これは、大量出血に伴う出血傾向が、凝固障害によるものだけではなく、重篤な低血圧<sup>31)</sup>、末梢循環不全による代謝性アシドーシス、低体温といったさまざまな因子に関係しているので注意深く観察して対処すべきである。<sup>32)</sup>

#### 参考 10 小児の外科手術

循環予備能が小さい小児患者においては、成人の出血量による輸血開始基準を当てはめることは問題になる場合があり、出血が予想される緊急手術前の貧血（8g/dl 未満）も赤血球輸血の対象として考慮する。また、外傷・術中出血による循環血液量の 15～20%の喪失の場合も赤血球輸血を考慮する。いずれの場合も、臨床状態から輸血開始の判断をすべきである。

参考 11 慢性貧血患者における代償反応

多くの慢性貧血患者においてはしばしば術前に食事が認められる。多くの慢性貧血患者においては、赤血球量は減少しているが、血漿量はむしろ増加しており、循環血流量は正常に保たれている。Ht 値低下に伴う血漿粘性減少により血管抵抗が減少するため、1 回心拍出量は増加し、心拍出量は増加する。そのため、血液酸素含有量は減少するものの、心拍出量増加により代償されるため、末梢組織への血液酸素運搬量は減少しない。組織における酸素採取率は上昇する。ただし、心疾患がある患者や高齢者では、貧血となるても心拍出量の代償的増加が起きにくいく。

慢性貧血では、2,3-DPG<sup>※</sup>増加により酸素解離曲線の右方シフトが起こるため、末梢組織における血液から組織への酸素受け渡しは促進される<sup>33)</sup>。赤血球液中の2,3-DPG量は減少しているため、多量の輸血を行ってもグロビン濃度を上昇させ血漿酸素含有量を増加させても、組織への酸素供給量は増加しないため、直ちに期待すべき効果がみられないことがあることに注意する<sup>34)</sup>。

※2,3-DPG : 2,3-ジホスホグリセリン酸

#### 参考 12 手術を安全に施行するのに必要とを考えられる Ht 値や出 Ht 値の最低値

全身状態が良好な高齢者の整形外科手術において、Ht 値を 41%から 28%に減少させても、心拍出量増加が起きなかつたという報告<sup>35)</sup>はあるが、Ht 値を 27~29%としても若年者と手術死亡率は変わらなかつたという報告もある<sup>36)</sup>。循環血液量が保たれるならば、Ht 値を 45%から 30%まで、あるいは 40%から 28%に減少させても、酸素運搬量は減少しないと報告されている<sup>37)</sup>。

正常な状態では全身酸素供給量は全身酸素消費量を上回っている。しかし、全身酸素供給量が減少していくと、全身酸素消費量も減少していく。このような状態では嫌気的代謝が起こっている。この時点での酸素供給量を critical oxygen delivery (DO<sub>2</sub>crit) という。冠動脈疾患患者では、DO<sub>2</sub>crit は 330mL/min であると報告されている<sup>38)</sup>。手術時に 500~2,000mL 出血し Ht 値が 24%以下になった患者では、死亡率が高かつたという報告もある<sup>39)</sup>。急性心筋梗塞を起こした高齢者では、Ht 値が 30%未満で死亡率が上昇するが、輸血により Ht 値を 30~33%に上昇させると死亡率が改善するという報告がある。また、根治的前立腺切除術において、術中の心筋梗塞発作は、術後腫脹や Ht 値が 28%未満では多かつたという報告がある<sup>40)</sup>。しかし、急性冠症候群において輸血を受けた患者では、心筋梗塞に移行した率や 30 日死亡率が高いことが報告されている<sup>41)</sup>。

冠動脈疾患患者においては、高度の貧血は避けるべきであるが、一方、Ht 値を上昇させすぎのも危険である可能性がある。Hb 値 10g/dL、Ht 値 30%程度を目標に輸血を行うのが適当であると考えられる<sup>42)</sup>。

全身状態が良好な若年者では循環血液量が正常に保たれていれば、Ht 値が 24~27%，Hb が 8.0~9.0g/dL であつても問題がないと考えられる<sup>43,44,45)</sup>。生理学的には Hb が 6.0~7.0g/dL であつても生体は耐えられるが、出血や心機能低下などが起きた場合に対処できる予備能は、非常に少なくなっていると考えるべきである。

周術期の輸血における指標やガイドラインについては、米国病理学会や米国麻酔科学会 (ASA) も輸血に対するガイドラインを定めている<sup>46,47,48)</sup>。実際、Hb 値が 10g/dL で輸血することはないが、これは少なくない<sup>49)</sup>。

#### 参考 13 術中の出血コントロールについて

出血量の多少はあるにしろ、手術により出血は必ず起こる。出血量を減少させるには、外科的止血のほか、出血量を増加させる内科的原因に対処する必要がある<sup>49)</sup>。出血のコントロールには、血管の結紮やクリップによる血管閉塞、充気凝固などによる確実な外科的止血のほか、高度の凝固因子不足に対する新鮮凍結血漿輸注、高度の血小板減少症や血小板機能異常に対しての血小板濃厚液投与など、術中の凝固検査のチェックを行い、不足した成分を補充する方法が有用である。

また、出血を助長するような因子を除去することも必要である。整形外科手術などでは低血压(人為的低血压)による血圧のコントロールが有用な場合がある。また、体温は軽度のものであつても術中出血を増加させる危険があるので、患者の保温にも十分に努めなければならない。

不適切な輸血療法を防ぐために、医師の輸血に関する再教育も重要である<sup>49)</sup>。

参考 14 アフェレシスに関する事項について

置換液として膠質浸透压を保つため、通常は等張アルブミン製剤等を用いるが、以下の場合に新鮮凍結血漿が用いられる場合がある。

- 1) 重篤な肝不全に対して、主として複合的な凝固因子の補充の目的で行われる血漿交換療法

保存的治療若しくは、肝移植によって病状が改善するまでの一時的な補助療法であり、PT が INR2.0 以上 (30%以下) を開始の目安とする。必要に応じて、血液濾過透析等を併用する。原疾患に対する明確な治療方針に基づき、施行中もその必要性について常に評価すること。原疾患の改善を目的とする治療が実施できない病態においては、血漿交換療法の適応はない。

重篤な肝障害において、新鮮凍結血漿を用いた血漿交換を強力に行う場合、クエン酸ナトリウムによる、代謝性アルカリーシス、高ナトリウム血症や、膠質浸透圧の急激な変化を来たす場合があるので、経時的観察を行い、適切な対応を行うこと。

- 2) 並存する肝障害が重篤で、除去了した止血系諸因子の血中濃度のすみやかな回復が期待できない場合。
- 3) 出血傾向若しくは血栓傾向が著しく、一時的な止血系諸因子の血中濃度の低下が危険を伴うと予想される場合。このような場合、新鮮凍結血漿が置換液として用いられるが、病状により必ずしも置換液全体を新鮮凍結血漿とする必要はなく、開始時は、等張アルブミンや、人工膠質液を用いることが可能な場合もある。

4 血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP) \*・溶血性尿毒症症候群 (HUS) : TTP では、血管内皮細胞由来の、通常より分子量の大きい von Willebrand Factor が、微小循環で血小板血栓を生じさせ、本症の発症に関与している。また、von Willebrand Factor Clearing Protease (vWF-CP; ADAMTS3) の著減や阻害因子の出現が主要な病因とされ、新鮮凍結血漿を置換液として血漿交換療法を行い、vWF-CP を補充し阻害因子を除去することが最も有効である。血漿交換療法を行い難い場合や、遺伝子性に vWF-CP の欠乏を認める場合、vWF-CP の減少を補充するため、新鮮凍結血漿の単回投与が効果を發揮する場合がある。一部の溶血性尿毒症症候群においても、新鮮凍結血漿を用いた血漿交換や血漿輸注が有効な場合がある。

\* BCSH. Guideline Guidelines on the Diagnosis and Management of the Thrombotic Microangiopathic Haemolytic Anemias. British Journal of Haematology 2003;120:555-573

4 血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP) \*・溶血性尿毒症症候群 (HUS) : TTP では、血管内皮細胞由来の、通常より分子量の大きい von Willebrand Factor が、微小循環で血小板血栓を生じさせ、本症の発症に関与している。また、von Willebrand Factor Clearing Protease (vWF-CP; ADAMTS3) の著減や阻害因子の出現が主要な病因とされ、新鮮凍結血漿を置換液として血漿交換療法を行い、vWF-CP を補充し阻害因子を除去することが最も有効である。血漿交換療法を行い難い場合や、遺伝子性に vWF-CP の欠乏を認める場合、vWF-CP の減少を補充するため、新鮮凍結血漿の単回投与が効果を発揮する場合がある。一部の溶血性尿毒症症候群においても、新鮮凍結血漿を用いた血漿交換や血漿輸注が有効な場合がある。

赤血球液-LR「日赤」及び照射赤血球液-LR「日赤」の容積は、200mL 全血由来 (RBC-LR-1) の約 140mL と 400mL 全血由来 (RBC-LR-2) の約 280mL の 2 種類がある。製剤中の白血球数は 1 パック当たり  $1 \times 10^6$  個以下であり、40mL 全血由來の製剤では、出血量は 50~65% 程度で、ヘモグロビン (Hb) 含有量は 20g/dL 程度である。  
赤血球液-LR「日赤」及び照射赤血球液-LR「日赤」の保存中の経時的な変化を示す(表2)  
60, 51)。

赤血球液-LR「日赤」及び照射赤血球液-LR「日赤」は、2~6°Cで保存する。  
なお、日本赤十字社では、かつての MAP 加赤血球濃厚液 (赤血球 N・A・P「日赤」) の製造承認取得時には有効期間を 42 日間としていたが、エルシニア菌混入の可能性があるため、現在は有効期間を 21 日間としている。

#### 参考 15 赤血球液の製法と性状

わが国で、全血採血に使用されている血液保存液は、CPD 液 (citrate-phosphate-dextrose: クエン酸ナトリウム水和物 26.30g/L, ケエン酸水和物 3.27g/L, ブドウ糖 23.20g/L, リン酸二水素ナトリウム 2.51g/L) 及び ACD-A 液 (acid-citrate-dextrose: クエン酸ナトリウム水和物 22.0g/L, ケエン酸水和物 8.0g/L, ブドウ糖 22.0g/L) であり、現在、日本赤十字社から供給される赤血球製剤では、CPD 液が使用されている。

また、赤血球保存用添加液としては MAP 液 (mannitol-adenine-phosphate:D-マンニトール 14.57g/L, アデニン 0.14g/L, リン酸二水素ナトリウム二水和物 0.94g/L, クエン酸ナトリウム 1.50g/L, ケエン酸 0.20g/L, ブドウ糖 7.21g/L, 塩化ナトリウム 4.97g/L) が使用されている。

#### 赤血球液 (RBC)

日本赤十字社は、過去、MAP 加赤血球濃厚液として赤血球 N・A・P「日赤」及び照射赤血球 M・A・P「日赤」を供給してきた。その後、平成 19 年 1 月より供給開始した保存前に白血球を除去した赤血球濃厚液 (RBC: 赤血球濃厚液-LR「日赤」及び照射赤血球濃厚液-LR「日赤」) を経て、平成 26 年 6 月より、かつての MAP 加赤血球濃厚液は赤血球液 (RBC: 赤血球液-LR「日赤」及び照射赤血球液-LR「日赤」) に名称変更されている。

赤血球液-LR「日赤」は、血液保存液 (CPD 液) を 25mL 又は 55mL 混合したヒト血液 200mL 又は 400mL から、当該血液パックに組み込まれた白血球除去フィルターを用いたろ過により白血球を除去した後に血漿の大部分を除いた赤血球層に、血球保存用添加液 (MAP 液)

表2 純血球液-LR「日本赤」(RBC-LR-2: 400mL 混血由来)の経時的変化

項目	1日目 (ml)	7日目	14日目	21日目	28日目
重量	276.5 ± 14.3	-	-	-	-
白血球数 (cells/L)	すべて適合	-	-	-	-
上清ヘモグロビン濃度 (mg/dL)	12.8 ± 3.5	25.6 ± 5.4	23.9 ± 9.3	42.1 ± 9.2	55.9 ± 14.1
ATP濃度 (μmol/L)	5.5 ± 0.9	7.5 ± 0.8	6.5 ± 0.8	6.0 ± 1.1	5.3 ± 1.2
2,3-DPG濃度 (μmol/L)	14.5 ± 0.9	13.2 ± 1.8	3.5 ± 0.5	0.3 ± 0.4	0.0 ± 0.0
上清カリウム濃度 (mmol/L)	124.6 ± 1.7	114.3 ± 1.5	108.8 ± 1.0	105.5 ± 2.4	102.4 ± 3.2
上清カルシウム濃度 (mmol/L)	1.2 ± 0.1	1.9 ± 0.1	2.05 ± 0.2	2.87 ± 0.2	4.50 ± 2.4
上清マグネシウム濃度 (mg/L)	0.2 ± 0.1	2.5 ± 0.3	3.9 ± 0.4	4.8 ± 0.4	5.7 ± 0.4
pH	7.23 ± 0.03	7.08 ± 0.02	6.87 ± 0.02	6.71 ± 0.03	6.63 ± 0.03
蛋白質濃度 (g/dL)	60.2 ± 3.2	60.3 ± 3.5	60.2 ± 3.8	60.2 ± 3.8	60.2 ± 3.8
ヘモグロビン (%)	54.2 ± 1.9	55.2 ± 1.8	53.1 ± 1.9	53.2 ± 2.2	52.8 ± 2.3
平均赤血球容積 (fl)	90.2 ± 4.2	68.3 ± 4.1	85.3 ± 4.1	88.4 ± 4.3	87.8 ± 4.3
ヘモグロビン濃度 (%)	18.6 ± 0.6	19.0 ± 0.7	18.9 ± 0.8	18.8 ± 0.7	18.3 ± 0.6
10%赤血球 (NBS-C)	0.517 ± 0.018	0.486 ± 0.015	0.499 ± 0.017	0.500 ± 0.020	0.501 ± 0.023
50%赤血球 (NBS-C)	0.473 ± 0.018	0.452 ± 0.019	0.452 ± 0.019	0.449 ± 0.021	0.446 ± 0.021
20%赤血球 (NBS-C)	0.422 ± 0.025	0.385 ± 0.024	0.380 ± 0.022	0.371 ± 0.024	0.372 ± 0.025

照付純血球液-LR「日本赤」(1[r=FRG]-LR-2: 400mL 混血由来)(n=8)

項目	1日目 (ml)	7日目	14日目	21日目	28日目
重量	274.8 ± 16.3	-	-	-	-
白血球数 (cells/L)	すべて適合	-	-	-	-
上清ヘモグロビン濃度 (mg/dL)	12.8 ± 4.3	24.8 ± 1.1	35.0 ± 15.5	42.3 ± 15.6	55.6 ± 26.8
ATP濃度 (μmol/L)	6.3 ± 0.7	6.4 ± 0.8	6.6 ± 0.6	6.3 ± 0.6	5.0 ± 0.9
2,3-DPG濃度 (μmol/L)	14.6 ± 1.4	0.7 ± 2.6	2.0 ± 2.0	0.6 ± 0.6	0.1 ± 0.3
上清カリウム濃度 (mmol/L)	123.4 ± 1.6	100.1 ± 3.3	92.4 ± 3.8	89.3 ± 3.2	85.8 ± 3.2
上清カルシウム濃度 (mmol/L)	1.7 ± 0.3	26.3 ± 4.8	43.5 ± 4.8	55.8 ± 4.3	60.3 ± 4.6
上清マグネシウム濃度 (mg/L)	0.2 ± 0.1	4.5 ± 10.7	6.2 ± 0.8	7.6 ± 0.8	7.6 ± 0.8
pH	7.20 ± 0.02	7.05 ± 0.02	6.84 ± 0.02	6.70 ± 0.02	6.64 ± 0.02
蛋白質濃度 (g/dL)	-	-	-	-	-
ヘモグロビン (%)	61.5 ± 2.5	62.0 ± 2.9	62.1 ± 2.7	61.7 ± 2.6	62.1 ± 2.4
平均赤血球容積 (fl)	94.3 ± 1.6	52.2 ± 1.0	51.3 ± 1.7	51.2 ± 1.8	51.1 ± 1.8
ヘモグロビン濃度 (%)	18.3 ± 2.4	84.2 ± 2.3	83.0 ± 2.4	82.0 ± 2.1	82.4 ± 2.2
10%赤血球 (NBS-C)	0.521 ± 0.017	0.484 ± 0.016	0.476 ± 0.018	0.472 ± 0.019	0.473 ± 0.020
50%赤血球 (NBS-C)	0.477 ± 0.018	0.429 ± 0.020	0.416 ± 0.019	0.410 ± 0.019	0.409 ± 0.021
20%赤血球 (NBS-C)	0.425 ± 0.020	0.353 ± 0.016	0.349 ± 0.016	0.345 ± 0.022	0.345 ± 0.020

平局士様率(%)

(日本赤社内資料より)

参考16 血小板濃厚液の製法と性状

血小板濃厚液の調製法には、採血した全血を常温に保存し製剤化する方法と、単一供血者から成分採血装置を使用して離脱する方法があるが、日本赤十字社から供給される血小板濃厚液では、全血採血由來の保存前白血球除去の導入により、白血球とともに血小板も除去されることから、製造工程において使用する白血球除去フィルターに吸着される(現在は、全血採血からは製造しておらず、後者の成分採血による方法の方が行われている)。

血小板製剤では、血小板数を単位数で表す。1単位は0.2×10<sup>11</sup>個以上である。

血小板濃厚液の製剤規格、実単位数と含有血小板数との関係を表3に示す。

HLA適合血小板濃厚液には、10, 15, 20単位の各製剤がある。

これらの血小板濃厚液の中には少量の赤血球が含まれる可能性がある。なお、平成16年10月より、保存前白血球除去技術が適用され、製剤中の白血球数は1パック当たり1×10<sup>6</sup>個以下となっている。

開封された血小板濃厚液は、輸血するまで室温(20~24°C)で水平振盪しながら保存する。

有効期間は採血後4日間である。

表3 血小板製剤の単位換算と含有血小板数

製剤規格	実単位数		含有血小板数(×10 <sup>11</sup> )
	1単位(約20mL)	2単位(約40mL)	
5単位(約100mL)	5	10	0.2
10単位(約200mL)	10	20	0.4
20単位(約250mL)	20	40	0.8
40単位(約400mL)	40	80	1.6
80単位(約800mL)	80	160	3.2
160単位(約1600mL)	160	320	6.4
200単位(約2000mL)	200	400	8.0
20×10 <sup>11</sup> 個	2.0×10 <sup>11</sup>	4.0×10 <sup>11</sup>	0.4
10×10 <sup>11</sup> 個	1.0×10 <sup>11</sup>	2.0×10 <sup>11</sup>	0.2
5×10 <sup>11</sup> 個	0.5×10 <sup>11</sup>	1.0×10 <sup>11</sup>	0.1

明示、日本赤十字社より転載する血小板製剤は完全分離由来である。

参考17 新鮮凍結血漿(FFP)の製法と性状  
全血採血由來の新鮮凍結血漿(新鮮凍結血漿-LR「日本赤」)は、血液保存液(CPD液)を25mL

又は56mL混合したヒト血液200mL又は400mLから当該血液バッグに組み込まれた白血球除去フィルターを用いたる過により白血球の大部を除去し、採血後8時間以内に分離した新鮮な血漿を-20°C以下に置き、凍結したもので、容量は約120mL (FFP-LR120) 及び約240mL (FFP-LR240) である。

成分採血由来の新鮮凍結血漿 (FFP-LR480) は、血液保存液(ACD-A液)を混合し、血液成分採血の大部分を除去して採取した新鮮な血漿を採血後6時間以内に-20°C以下に置き、凍結したもので、容量は約480mLである。

製剤中の白血球数は、1バッジ当たり $1 \times 10^6$ 個以下である。

新鮮凍結血漿-LR「日赤」は採血後1年間である。

新鮮凍結血漿-LR「日赤」の経時的変を表4に示す。含有成分は血液保存液により希釈され、単位容積当たりの濃度は正常血漿と比較して、およそ10~15%低下している。

また、血漿中の凝固因子活性の個人差は大きいが、新鮮凍結血漿中でもほぼ同様な凝固因子活性が含まれている。ただし、不安定な因子である凝固第V、因子活性はわずかながら低下する。一方、ナトリウム濃度は血液保存液中のクエン酸ナトリウム水和物及びシアン酸二水素ナトリウムの添加により増量している。なお、正常血漿1mL中に含まれる凝固因子活性を1単位(100%)という。また、日本赤十字社が供給する輸血用血液製剤は、採血時ににおける問診等の検査、採血血液に対する感染症関連の検査等の安全対策を講じており、さらに新鮮凍結血漿では6ヵ月間の貯留保管<sup>1)</sup>を行っているが、感染性の病原体に対する不活化処理はなされておらず、人の血液を原料としていることに由來する感染症伝播等のリスクを完全には排除できないため、疾病の治療上の必要性を十分に検討の上、必要最小限の使用にとどめる必要がある。

#### 注1) 貯留保管 (Quarantine)

とは、一定の期間隔離保管する方法である。採血時の問診や献血血液に対する核酸増幅検査(NAT)を含めた感染症関連検査等で

も、感染リスクの排除には限界がある。

貯留保管期間中に、選択調査の結果及び献血後情報等により感染リスクの高い血液があることが判明した場合、その輸血用血液(ここで新鮮凍結血漿)及び血漿分画製剤用原料血漿を確保(抜き取って除外)することにより、より安全性の確認された血液製剤を医療機関へ供給する安全対策である。

新鮮凍結血漿の有効期間は1年間であるが、日本赤十字社では、6ヵ月間の貯留保管をした後に医療機関へ供給している。

表4 新鮮凍結血漿-LR「日赤」の経時的変化

項目	新鮮凍結血漿-LR「日赤」(FFP-LR240; 400mL採血由来) (n=7)					
	1日目	1か月目	3か月目	6か月目	9か月目	12か月目
容量 (mL)	229 ± 14 <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-
白血球 すべて適合 <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-
凝固第II因子 (%)	100 ± 3 <sup>3)</sup>	97.4 ± 1.9	97.0 ± 1.9	95.0 ± 2.9	97.0 ± 2.1	82.6 ± 6.7
凝固V因子 (%)	100 ± 3 <sup>3)</sup>	96.0 ± 3.6	95.0 ± 6.0	92.8 ± 2.6	89.7 ± 3.2	83.6 ± 2.9
凝固VIII因子 (%)	100 ± 3 <sup>3)</sup>	95.6 ± 3.8	95.3 ± 4.0	92.3 ± 7.0	92.1 ± 5.8	80.0 ± 6.2
プロトロビン時間 (秒)	9.2 ± 0.3 <sup>3)</sup>	9.2 ± 0.4	9.4 ± 0.3	9.4 ± 0.3	9.3 ± 0.2	9.3 ± 0.2
トロポラクチン時間 (秒)	40.3 ± 4.2 <sup>3)</sup>	40.3 ± 4.6	41.7 ± 3.4	38.9 ± 4.2	44.2 ± 6.2	42.8 ± 3.4
上清ヘモグロビン濃度 (mg/dL)	50 ± 0.9 <sup>4)</sup>	-	-	-	-	7.6 ± 3.0
上清ナトクリム濃度 (mg/dL)	167.4 ± 2.1 <sup>4)</sup>	-	-	-	-	165.5 ± 3.0
上清カラニン濃度 (mg/dL)	3.3 ± 0.2 <sup>4)</sup>	-	-	-	-	4.2 ± 0.4
上清ガラクム濃度 (mg/dL)	0.8 ± 0.1 <sup>4)</sup>	-	-	-	-	1.0 ± 0.1
pH	7.34 ± 0.03 <sup>4)</sup>	-	-	-	-	7.39 ± 0.03

平均±標準偏差

1) n = 45, 2) 1日目(採血当日)の活性を100%とした, 3) n = 42, 4) n = 12

(日本赤十字社社内資料より)

## 参考18 アルブミンの製法と性状

- 1) 製法・製剤  
アルブミン製剤は、多人数分の血漿をプールして、冷エタノール法により分画された大人白成分である。含有たん白質の96%以上がアルブミンである飽和を人血清アルブミンといい、等張（正常血漿と膠質浸透圧が等しい）の5%溶液と高張の20、25%溶液とがある。また、等張剤にはアルブミン濃度が4.4wt%以上で含有たん白質の80%以上がアルブミン（一部のグロブリンを含む）である加熱人血漿たん白製剤もある。これらの製剤はいずれも60°C10時間以上の液状加熱処理がなされており、エンベロープをもつ肝炎ウイルス(HBV, HCVなど)やヒト免疫不全ウイルス(HIV)などの既知のウイルス性疾患の伝播の危険はほとんどない。しかしながら、これまでに感染例の報告はないもののエンベロープのないA型肝炎ウイルス(HAV), E型肝炎ウイルス(HEV)などやブリオン等の感染の可能性については今後も注視していく必要がある。
- 2) 性状・代謝  
アルブミンは686個のアミノ酸からなる分子量約66,500ダルトンのたん白質である。正常血漿の膠質浸透圧のうち80%がアルブミンによって維持されており、アルブミン1gは約20mLの水分を保持する。アルブミンの生体内貯蔵量は成人男性では約300g(4.6g/kg体重)であり、全体の約40%は血管内に、残りの60%は血管外に分布し、相互に交換しながら循環状態を保っている。生成は主に肝(0.2g/kg/日)で行われる。この生成はエネルギー供給量、血中アミノ酸量、ホルモンなどにより調節され、これに血管外アルブミン量、血漿膠質浸透圧などが関与する。アルブミンの生成は血管外アルブミン量の低下で亢進し、増加され、また膠質浸透圧の上昇で生成は抑制される。その分解は筋肉、皮膚、肝、腎などで行われ、1日の分解率は生体内貯蔵量のほぼ4%である。また生体内でのアルブミンの半減期は約17日である。
- 3) despite national consensus guidelines. Anesthesiology 1998;88:327-333
- 4) Hessel EA, et al:Platelet kinetics during deep hypothermia. Journal of Surgical Research 1980;28:23-34
- 5) Valeri CR, et al:Hypothermia-induced reversible platelet dysfunction. Annals of Surgery 1987;205:175-181
- 6) Michelson AD, et al:Reversible inhibition of human platelet activation by hypothermia in vivo and in vitro. Thrombosis and haemostasis 1994;71:633-640
- 7) Boldt J, et al:Normothermic versus hypothermic cardiopulmonary bypass do changes in coagulation differ? Annals of Thorac Surg 1996;62:130-135
- 8) Nutall GA, et al:Efficacy of a simple intraoperative transfusion algorithm for nonthyroidectomy component utilization after cardiopulmonary bypass. Anesthesiology 2001;94:773-781
- 9) Karasik JM, et al:Etiology of preoperative anemia in patients undergoing scheduled cardiac surgery. Can J Anesth 1999;46:979-982
- 10) Williams GD, et al:Factors associated with blood loss and blood product transfusions: A multivariate analysis in children after open-heart surgery. Anesth Analg 1999;89:57-64
- 11) Shore-Lesserson, et al:Thromboelastography-guided transfusion algorithm reduces transfusions in complex cardiac surgery. Anesth Analg 1999;88:312-319
- 12) Bougenis D, et al:Blood use in lung resection for carcinoma: perioperative elective anaemia does not compromise the early outcome. Eur J Cardiothorac Surg 2001;20:372-377
- 13) Motoyama S, et al:Use of autologous instead of allogeneic blood transfusion during esophagectomy prolongs disease-free survival among patients with recurrent esophageal cancer. J Surg Oncol 2004;15:26-31
- 14) Takeimura M, et al:Immunologic effects of allogeneic versus autologous blood transfusion in patients undergoing radical oesophagectomy. Eur Surg Res 2003;35:115-122
- 15) Dresner SM, et al:Prognostic significance of peri-operative blood transfusion following radical resection for oesophageal carcinoma. Eur J Surg Oncol 2000;26:492-497
- 16) Schmid H, et al:The effects of red-cell scavenging, hemodilution, and active warming on allogeneic blood requirements in patients undergoing hip or knee arthroplasty. Anesth Analg 1998;86:387-391
- 17) McSwiney MM, et al:Blood transfusion in total hip arthroplasty: guidelines to eliminate variability in transfusion practice for coronary artery bypass surgery persists

## 文献

- 1) Varmavas EC: Is white blood cell reduction equivalent to antibody screening in preventing transmission of Cytomegalovirus by transfusion? A review of the literature and meta-analysis. Transfusion Med Rev 2005;19(3):181-199
- 2) Stover EP, et al:Variability in transfusion practice for coronary artery bypass surgery persists

- overtransfusion. Can J Anaesth 1993;40: 3:222-226
- 18) Olsiger D, et al:Acute normovolemic hemodilution decreases postoperative allogeneic blood transfusion after total knee replacement. Br J Anaesth 1997;79:317-321
- 19) Thomas D, et al: Autologous blood transfusion in total knee replacement surgery.Br J Anaesth 2001;86:669-673
- 20) Neillipovitz DT, et al:A Randomized trial of tranexamic acid to reduce blood transfusion for scoliosis surgery.Anesth Analg 2001;93:82-87
- 21) Shimied H, et al:Mild hypothermia increases blood loss and transfusion requirements during total hip arthroplasty. Lancet 1996;347:289-292
- 22) Monk TG, et al:Acute normovolemic hemodilution can replace preoperative autologous blood donation as a standard of care for autologous blood procurement in radical prostatectomy. Anesth Analg 1997;85:953-958
- 23) Bryson GI, et al:Does acute normovolemic hemodilution reduce perioperative allogeneic transfusion? A meta-analysis. Anesth Analg 1998;86:9-15
- 24) Hogue CW Jr, et al:Perioperative myocardial ischemic episodes are related to hematocrit level in patients undergoing radical prostatectomy. Transfusion 1998;38:924-931
- 25) Linko K, et al:Electrolyte and acid-base disturbances caused by blood transfusion.Acta Anaesthesiol Scand 1986;30:139-144
- 26) Brown KA, et al:Hyperkalemia during rapid blood transfusion and hypovolaemic cardiac arrest in children. Can J Anaesth 1990;37:747-754
- 27) Jameson LC, et al:Hyperkalemic death during use of a high-capacity fluid warmer for massive transfusion. Anesthesiology 1990;73:1050-1052
- 28) Rock G, et al:Effect of citrate anticoagulations on factor VIII levels in plasma. Transfusion 1988;28:248-252
- 29) Murray DJ, et al:Coagulation changes during packed red cell replacement of major blood loss. Anesthesiology 1983;83:9-845
- 30) Consensus Conference:Fresh frozen plasma.Indications and risks. JAMA 1985;253:551-553
- 31) Harke H, et al:Haemostatic disorders in massive transfusion.Bibl Haematol 1980;46:179-188
- 32) Ferrara A, et al:Hypotension and acidosis worsen coagulopathy in the patient requiring multiple transfusion.Am J Surg 1990;160:15-18
- 33) Sunder-Plassman L, et al:Acute normovolemic hemodilution: change in tissue oxygen supply and hemoglobin-oxygen affinity. Bibl Haematol 1975;41:44-53
- 34) Shah DM, et al:Failure of red blood cell transfusion to increase oxygen transport or mixed venous PO<sub>2</sub> in injured patients.J Trauma 1982;22:741-746
- 35) Rosberg B, et al:Haemodynamics following normovolemic hemodilution in elderly patients. Acta Anaesthesiol Scand 1981;25:402-406
- 36) Vara-Thorbeck R, et al:Haemodynamic response of elderly patients undergoing major surgery under moderate normovolemic hemodilution.Eur Surg Res 1985;17:372-376
- 37) Messmer K:Haemodilution.Surg Clin North Am 1975;55:659-678
- 38) Shibusaki K, et al:Critical levels of oxygen delivery in anesthetized man.Crit Care Med 1983;11:640-643
- 39) Carson JL, et al:Severity of anaemia and operative mortality and morbidity. Lancet 1988;1:727-729
- 40) Hogue CW Jr, et al:Perioperative myocardial ischemic episodes are related to hematocrit level in patients undergoing radical prostatectomy.Transfusion 1998;38:924-931.
- 41) Rao SV, et al:Relationship of blood transfusion and clinical outcome in patients with acute coronary syndromes.JAMA 2004;292:1555-1562
- 42) Wu WC, et al:Blood transfusion in elderly patients with acute myocardial infarction. N Engl J Med 2001;345:1230-1236
- 43) Stehling L, et al:The red blood cell transfusion trigger.Arch Pathol Lab Med 1994;118:429-434
- 44) Spence RK:Emerging trends in surgical blood transfusion. Semin Hematol 1997;34:48-53
- 45) Task force on blood component therapy:Practice guidelines for blood component therapy. A report by the American Society of Anesthesiologists task force on blood component therapy.Anesthesiology 1996;84:732-747
- 46) College of American Pathologists:Practice parameter for the use of fresh-frozen plasma, cryoprecipitate, and platelets.JAMA 1994;271:777-781
- 47) Simon A, et al:Practice parameter for the use of red blood cell transfusions.Arch Pathol Lab Med 1998;122:130-138
- 48) American Society of Anesthesiologists Task Force on Blood Component Therapy:Practice guidelines for blood component therapy:A report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on blood component therapy.Anesthesiology 1996; 84:732-747
- 49) Nuttall GA, et al: Current transfusion practices of members of the American Society of Anesthesiologists:A survey. Anesthesiology 2003;99:1433-1443
- 50) 岩雅之, 他 : MAP 加濃厚赤血球の製造と長期保存試験. 日輸血会誌 1991 ; 37 : 404-410
- 51) 笹川滋, 他 : 長期保存 MAP 加濃厚赤血球の有効性について—Survival study— 日輸血会誌 1991 ; 37 : 411-413

参考資料1 DIC検査基準－1988年改正－

		指標	V 判定 (注2)	V 判定 (注2)
1	意識状態	1 あり 0 なし	1) 7点以上 DIC 5点以下 DICの疑い (注3) 5点以下 DICの可能性少ない	1) 7点以上 DIC 5点以下 DICの疑い (注3) 5点以下 DICの可能性少ない
I	臨床症状	1) 出血症状 (注1) 2) 感染症状 3) 血栓形成	2) 白血球数の亢進に特徴とする疾患 3点 DICの疑い (注3) 2点以下 DICの可能性少ない V 結核のための出血性結核症候群、所見 1) 可溶性フィブリノーゲン一陽性 2) D-D ダイマーの高値 3) トロンビン・アンジオテンシン活性化体の高値 4) ブラクミン・α2 プラズミンゲーニンヒビタミン複合体の高値 5) 血小板増加症にて、抗原抗体複合体による凝集が強調される。とくに抗自免疫疾患にて、抗原抗体複合体による凝集が強調される。とくに抗自免疫疾患にて、抗原抗体複合体による凝集が強調される。	2) 白血球数の亢進に特徴とする疾患 3点 DICの疑い (注3) 2点以下 DICの可能性少ない V 結核のための出血性結核症候群、所見 1) 可溶性フィブリノーゲン一陽性 2) D-D ダイマーの高値 3) トロンビン・アンジオテンシン活性化体の高値 4) ブラクミン・α2 プラズミンゲーニンヒビタミン複合体の高値 5) 血小板増加症にて、抗原抗体複合体による凝集が強調される。とくに抗自免疫疾患にて、抗原抗体複合体による凝集が強調される。とくに抗自免疫疾患にて、抗原抗体複合体による凝集が強調される。
II	血小板数 (×10 <sup>4</sup> /μl) (注1)	40~50 <40 <20 <10 >10	3 2 1 0 1	3 2 1 0 1
2)	血小板数 (>10 <sup>4</sup> /μl) (注1)	50~200 >50 >80 >100 <120	3 2 1 0 0	3 2 1 0 0
3)	血漿フィブリノゲン濃度 (mg/dl)	100~200 >100 >150 <150	2 1 1 2	2 1 1 2
4)	プロトロビン時間 (正常範囲で満たす値)	1.67 正常 <1.67 >1.67	2 1 0	2 1 0

注1: 白血球数は白血球減少症、再生不良性貧血、粒球減少症等で、高度の白血球減少がある場合は白血球より全血細胞数で、高度の白血球減少がある場合は白血球より全血細胞数で算出する。

注2: 判定はV-2) に従う。

注3: 基本検査が既定価値はV-1) の通りとする。

a. 血小板増加症による偽陽性肝炎（脂膜炎上）

小葉間膜炎を呈する慢性肝炎の場合には、経時

点から3点減点が上位まで、V-1) の判定が差さる。

b. 血栓形成などによる偽陽性肝炎の場合は、本検査

基準そのまゝを適用する。

注3: V-1) の疑われる場合でV-2) 検査のための補助的検査成

績、所見のうち2項目以上満たせばDICと判定する。

注4: 除外規定

1) 本検査結果は新生児、産科検査のDIC診断には適用しない。

2) 本検査結果は既往歴のDICの診断には適用しない。

厚生省血液凝固異常疾患調査研究会基準

(昭和62年度)

参考資料2

輸血実施手順書		日本輸血学会
2003年3月作成		
<p><b>① 輸血同意書の取得</b></p> <p>主治医は輸血の必要性、リスク等について患者または代理人に説明し、一連の操作を行う旨に、必ず輸血同意書を得る。</p>		
<p><b>② 血液型の検査と記録</b></p> <p>輸血を実施するまでに患者の輸血履歴の既往歴を検査する。検体には止める。献血者、所属会員、院内会員を含む。検査結果を医者に知らせるとともに、カルテに血液型検査結果を記付する。</p>		
<p><b>③ 治療行為の計画</b></p> <p>主治医は輸血の理由を明確に記載し、治療方針を提出し、医師の署名を記載する。主治医と受診者の血液型を明記する。また当該医者は対照検査にて輸血部位と供給部位を確認する。</p>		
<p><b>④ 血液バッグの計画 一回までに済む</b></p> <p>次の3つの手順を医療改善導入として、実行して開合し、所定欄にサインする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 血液型について、血漿バックと交換混合式適合血液は下記手順で取り扱う。カルテにて、有効期限内であることを確認し、有効期限内であることを記載する。</li> <li>② 血漿混合液が包装の蓋を通り抜けているか確認する。</li> <li>③ 血液バッグの袋口に滅菌、紫色、滅菌検査の表示が無いか確認する。</li> </ol>		
<p><b>⑤ 患者の確認</b></p> <p>患者と血液バックを離く。 患者の姓名と血液バックの姓名と血漿型及び混合血液の姓名の確認と一致していることを確認する。</p>		
<p>注: 動物からなる由来をもつてどちらか、又は日本国外で栽培された植物由来のベクターやセドウモドキなどで、リスクハイリスクを除いて輸血を行つてからモドキにて、本法のない輸血は、ベッドセドウモドキにて、本法モドキにて輸血を行つ。</p>		
<p><b>⑥ 適合率にサイン</b></p> <p>患者と血液バッグの混合袋、ヘッドサードで適合率のサイン欄にサインして輸血を開始する。</p>		
<p><b>⑦ 輸血担当者の監察</b></p> <p>輸血開始後5分間、患者の状態を観察する。15分後と終了時にも観察し、輸血副作用の有無、内容を記録する。</p>		
<p><b>⑧ 使用血液の配達</b></p> <p>カルテに血液バッグの輸送番号(輸送ラベル)を記録する。</p>		

## (参考)

「血液製剤の使用指針」、「血小板製剤の使用基準」及び「輸血療法の実施に関する指針」の改定のための作成委員（平成17年9月当時）

○ 薬事・食品衛生審議会血液事業部会適用調査会  
④は座長（計15名、氏名五十音順）

氏名	現職	氏名	現職
稻田 英一	ありがな いなだ えいいち	川口 毅	かわぐち たけし
河野 文夫	かわの ふみお	木村 厚	きむら あつし
		清水 騰	しみず まさる
		白幡 啓	しらはた あきら
		鈴木 洋通	すずき ひろみち
④高橋 孝喜	たかはし こうき	④高橋 純樹	たかまつ じゅんき
		田島 知行	たじま ともゆき
		花岡 一雄	はなおか かずお
		堀内 龍也	ほりうち りゅうや
		三谷 紗子	みたに きぬこ
		森下 清雄	もりした やすお
		門田 守人	もんでん もりと
		○ 専門委員	
上田 春典	うえだ ぶりがな	上田 春典	うえだ ぶりがな
高本 滋	しげる	高本 滋	しげる
月本 一郎	いちろう	月本 一郎	いちろう
半田 試	はんだ まこと	半田 試	はんだ まこと
比留間 淳	ひるま きよし	比留間 淳	ひるま きよし
前川 平	まえかわ たいら	前川 平	まえかわ たいら
山本 保博	やすひろ	山本 保博	やすひろ

（計17名、氏名五十音順）

## ■ 血の特性和血液の出発手順

①ABO型検査 (ABO型のオモチ・ヤララ検査とRh(D)型検査) の判定とその記録・報告には別に採血したもの) を用いて、ABO型の再検査と交叉適合試験を実施し、交叉適合試験合算率(以下詳述)を作成する。

②輸血申し込み依頼に添付して、医者の文書適合試験用血液型検査用とは別に採血したものを用いて、ABO型の再検査と交叉適合試験を実施し、交叉適合試験合算率(以下詳述)を作成する。

③輸血申し込み依頼の墨書き姓名・性別・年齢(ABO型 Rh(D)型)及び血漿バッグの血型表示を照合し、両者が一致する。

④輸血申し込み依頼の血漿バッグの表面に表示する。血液型と血漿バッグの色(赤、青、緑、黄色)、溶媒液体を表示する。

⑤輸血申し込み依頼と血漿バッグを同一患者と正誤表示が附合し、両者が一致する。

⑥所定期にサインする。

## 緊急時の判断

出血性ショックなどで、患者のABO型検査を行う問題的資格がない場合

①患者にABO型不適合による深血管の溶血性の少ない脱水症血漿MAPを輸血すること。


②血漿袋はアルブミン(静注)を使用することを解説し、同意を得ておく。

③輸血前に患者から輸液装置等に接続する。

④輸液管(ABO型Rh(D)型)が判明した時点で、交叉適合試験適合の濃度溶血回数の輸血に切り替える。

## ABO型不適合輸血時の対応方法

患者に示すような未採血のミスター・ミスマッチの場合は、不適合輸血の症状が現れた場合には、下記のような対応が望ましい。



①適切な輸血を中心とする。

②留置針はそのまま差し、換液器で新しい輸液セットに交換して、乳酸リンゲル液を急速に輸入し、

③血圧測定と利尿に努める。(通常は2~3ml)

④バイタルサイン(脈搏、体温、呼吸、神経学)を15分毎にチェックし記録する。血圧低下が見られた時はドexam (0~1mg/kg/min)を静脈注入する。

⑤アングル静注する。

⑥頭部を高くする。

⑦頭部によく血流促進などの治療が必要である。

⑧頭部によく血流促進などの治療が必要である。

⑨頭部によく血流促進などの治療が必要である。

⑩頭部によく血流促進などの治療が必要である。

⑪頭部によく血流促進などの治療が必要である。

⑫頭部によく血流促進などの治療が必要である。

⑬頭部によく血流促進などの治療が必要である。

⑭頭部によく血流促進などの治療が必要である。

⑮頭部によく血流促進などの治療が必要である。

⑯頭部によく血流促進などの治療が必要である。

⑰頭部によく血流促進などの治療が必要である。

⑱頭部によく血流促進などの治療が必要である。

「血液製剤の使用指針」の一部改正時（平成28年5月）の委員

○ 薬事・食品衛生審議会血液事業部会適正使用調査会  
⑤は座長（計15名、氏名五十音順）

氏名	現職	姓
稻田 英一 いなだ えいいち	順天堂大学医学部附属科学・ペインクリニック講師主	田 稲
稲波 弘彦 ひろひこ	任教授 医療財團法人岩井医療財团岩井整形外科内科病院 理事長	波 稲
薄井 紀子 うすい のりこ	東京慈恵会医科大学附属第三病院輸血部診療部 部長	井 薄
大戸 齊 おおと ひとし	福島県立医科大学医学部 輸血・移植免疫学教授	戸 大
兼松 隆之 かねまつ たかし	地方独立行政法人長崎市立病院機構 理事長	松 兼
上條 亜紀 かみじょう あき	横浜市立大学附属病院輸血・細胞治療部 部長	條 上
鈴木 邦彦 すずき くにひこ	公益社団法人日本医師会 常任理事	木 鈴
鈴木 洋史 すずき ひろし	公益社団法人日本薬剤師会 副会長	木 鈴
田中 純子 たなか じゅんこ	広島大学医学部保健学研究部助教 教員	中 田
田中 政信 たなか まさのぶ	東邦大学医学部客員教授	中 田
種本 和雄 たねもと かずお	川崎医科大学心臓血管外科学教授	本 種
○ 半田 誠 はんだ まこと	慶應義塾大学医学部輸血・細胞療法センター非常勤講師	田 半
益子 邦洋 まさこ くにひろ	医療法人社団永生会南多摩病院 院長	子 益
三谷 緑子 みたに きぬこ	獨協医科大学血液内科教授	谷 三
矢口 有乃 やべち ありの	東京女子医科大学救命医学教授	口 矢